

Orchidaceae

Ophrys bilunulata

(Risso) Aldasoro & L. Sáez, Fl. Iber. 21: 177 (2005)



Sinónimos

negrita = nombre aceptado rojo = homotípicos verde = heterotípicos negro = sensu

Ophrys fusca subsp. *bilunulata* (Risso) Aldasoro & L. Sáez, Fl. Iber. 21: 177 (2005)

Ophrys bilunulata Risso, Fl. Nice 463 (1844)

Ophrys diana M.R. Lowe, Piera, M.B. Crespo & J.E. Arnold in J. Eur. Orchid. 33: 552 (2001)

Ophrys fabrella Paulus & Ayasse ex P. Delforge in Naturalistes Belges 85: 119 (2004)

Ophrys lucentina P. Delforge in Naturalistes Belges 80: 253 (1999)

Ophrys funerea auct. , non Viv.

Nombres vernáculos

¿?

Localizaciones estudiadas

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 36, 1050 m , en claros de bosque de *Quercus ilex* y *Quercus faginea*, Fuensanta de Martos, 30SVG 16, 770 m, en pastizal.



A. Hábito.



B. Flor en vista frontal (izquierda). Flor en vista lateral (derecha).

Observaciones

Citada por primera vez en la provincia de Jaén en [LARA RUIZ, J. & S. TELLO MORA \(2009\). Contribución al conocimiento de la orquidoflora del sector subbético giennense. *Micobotánica-Jaén* AÑO IV Nº 4 \(2009\)](#)

Descripción, distribución y otras fotografías

Flora Vascular de Andalucía Oriental: G.b. 12–40 cm. Tubérculos 2(3), subglobosos, sésiles. Hojas basales 4–10 cm, ovado-lanceoladas u oblongo-lanceoladas. Inflorescencia laxa; brácteas inferiores mas largas que el ovario, oblongo-lanceoladas, de color verde claro o verde amarillento. Sépalos laterales libres, cóncavos, de color verde amarillento o verde blanquecino. Pétalos laterales 4–6 mm, convergentes con el sépalo central, oblongo-lineares, de color verde amarillento o pardo verdoso. Labelo 9–15 mm, mas largo que ancho, con anchura máxima inferior al doble de la parte mas estrecha, trilobulado, con lóbulos laterales situados hacia la mitad y lóbulo central emarginado y sin apéndice carnososo terminal, de márgenes aplanados, velutino, negruzco, pardo violáceo o pardo oscuro, con reborde marginal amarillo de c. 1 mm de anchura, con una acanaladura en forma de V en la base; macula bipartida, poco brillante, generalmente glabra, con el borde apical de color gris-azulado. Ginostemo obtuso, sin apículo. Fruto capsula, erecto. II–V.

Claros de bosques y matorrales mediterráneos, 100–900 m (t–m). Mediterránea occidental. Cazoria, Ronda. rr. NT.



Ophrys bilunulata