

Note complémentaire sur *Dryadella ana-paulae*

Nous avons décrit l'espèce *Dryadella ana-paulae* dans Castro Neto *et al.*, 2004. Nous voulons ici la comparer avec son plus proche parent, *Dryadella susanae* (Pabst) Luer.

Le genre *Dryadella* Luer, malgré la relative homogénéité des caractères morphologiques floraux qui permet d'en distinguer facilement les membres des autres *Pleurothallidinae*, n'est guère homogène quant à l'aspect de la plante, à l'exception des plantes aux feuilles charnues, parmi lesquelles se range précisément *D. ana-paulae*. Cela s'explique par la sécheresse plus marquée sur le Plateau Central entre les mois de mai et octobre, à laquelle la plante doit faire face.

L'unique espèce parmi celles actuellement décrites pour le Brésil et présentant quelque ressemblance dans l'aspect végétatif, à savoir des feuilles charnues et elliptiques, est *Dryadella susanae* (Pabst) Luer, les autres taxons ne présentant pas cette caractéristique morphologique.

Le tableau 1 montre les principales différences morphologiques entre les fleurs de *Dryadella ana-paulae* et *Dryadella susanae*.

	<i>Dryadella susanae</i>	<i>Dryadella ana-paulae</i>
taille de la fleur tamanho da flor	environ 8 mm cerca de 8 mm	environ 5 mm cerca de 5 mm
sépale dorsal sépalas dorsal	elliptique, apex aigu elíptica, ápice agudo	obovale, apex caudal-acuminé oboval, ápice caudato-acuminado
sépales latéraux sépalas laterais	obovales, apex brusquement acuminé oboval, abrupto acuminado	obovales-obliques, apex caudé oboval-obliquo, ápice caudato
pétales pétalas	rhomboïdes avec des apicules latéraux rombóides com apículos laterais	rhomboïdes sans apicules latéraux rombóides sem apículos laterais
labelle labelo	spathulé avec lobe médian obovale espatulado com lobo médio oboval	spathulé avec lobe médian sub-rectangulaire espatilado com lobo médio sub-retangular
colonne coluna	apex auriculé ápice auriculado	apex rétus ápice retuso

Tableau 1 : comparaison de quelques caractères floraux chez *Dryadella susanae* et *Dryadella ana-paulae*

Comme il n'avait pas été possible d'accompagner l'article original d'une photographie de la fleur de l'espèce décrite, nous mettons cette note à profit pour en proposer une (voir page 164).

Nous indiquons enfin quelques références bibliographiques dans lesquelles le lecteur pourra trouver des informations complémentaires :

Castro Neto, V. P., B. P. de Faria & A. D. de Santana, 2004. Première occurrence du genre *Dryadella* Luer (Orchidaceae) dans le centre-ouest du Brésil, *Richardiana* IV(4) :197.

Dressler, R. L., 1993. *Phylogeny and Classification of the Orchid Family*. Dioscorides Press, Portland, USA.

Hoehne, F. C., 1949. *Iconografia de Orchidáceas do Brasil*. Graphicars-F. Lanzara. São Paulo, Brésil.

Luer, C. A., 1978. *Dryadella, Selbiana*. 2:207.

Pabst, G. F. & F. Dungs, 1975 et 1977. *Orchidaceae Brasilienses*, vol. I et II, Brücke-Verlag Kurt, Schimersow, Hildesheim, Allemagne.

Vitorino P. Castro Neto

Rua Vicente Galafassi, 549 – 09770-480 S.B.Campo, SP (Brésil) – vpcastro@hitnet.com.br

Bento Paschoal de Faria

SQN 106, bl. F, ap. 403, 70.742-060 – Brasília, DF (Brésil)

Alexandre Dutra de Santana

Condomínio Vivendas da Serra, Rua B, casa 22, 73.070-025 – Sobradinho, DF