

Le genre *Rubus* dans le nord-est de la France, additions et corrections

par Jean-Marie Royer & Yorick Ferrez

Jean-Marie Royer, 42 bis rue Mareschal, F-52000 Chaumont

Courriel : jeanmar.royer@wanadoo.fr

Yorick Ferrez, Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des invertébrés, 7 rue Voirin, F-25000 Besançon

Courriel : yorick.ferrez@cbnfc.org

Résumé – Cet article corrige et complète les données publiées dans Ferrez & Royer (2021) notamment celles concernant la répartition des taxons et les changements de nomenclature.

Mots-clés : *Rubus*, nomenclature, chorologie.

En décembre 2021 était publié le livre « Le genre *Rubus* dans le nord-est de la France », fruit de plus de quinze années de travail de terrain et de recherches bibliographiques ainsi que dans les herbiers historiques. Nous avons pris en compte l'essentiel des données connues jusqu'à l'année 2020. Néanmoins certaines sources bibliographiques avaient été incomplètement utilisées et de nombreuses excursions batologiques en 2021 et 2022, en particulier dans la pointe de Givet (Ardennes), autour de Wissembourg (Bas-Rhin) et en Argonne (Marne et Meuse) ont apportées de nombreuses données inédites. La révision de nos herbiers a également permis d'établir l'identité de plusieurs récoltes anciennes restées indéterminées jusqu'à aujourd'hui. Cet article a pour but de faire connaître les éventuels oublis et les principales découvertes réalisées depuis la parution de ce livre ainsi que de corriger ou compléter certains documents que nous avons publiés, en particulier les cartes départementales de répartition

des espèces. Nous envisageons successivement les nouveautés nomenclaturales, les espèces nouvellement observées dans la région, les principales découvertes relatives aux espèces rares du nord-est et les corrections et compléments apportées aux cartes de répartition.

Changements nomenclaturaux

- ***Rubus eckhartii* W.Jansen** : ce taxon correspond à *R. grabowskii* subsp. *walsemannii* Henker & Kiesew élevé au rang d'espèce par Jansen (2021) comme nous l'avions indiqué dans notre ouvrage où l'on trouvera les caractères distinctifs de *R. eckhartii* et de *R. grabowskii*. Il semble que *R. eckhartii* soit largement dominant dans le nord-est, *R. grabowskii* proprement dit n'étant identifié actuellement qu'aux environs de Chaumont (forêt du Corgebin, Chamarandes, bois de Crenay entre Crenay et Richebourg).
- ***Rubus favonii* W.C.R. Watson** : il s'agit du nom correct pour *R. neumannianus* H.E. Weber & Vannerom

(Mercier, comm. écrite). Nous n'avons pas rédigé de fiche pour *R. neumannianus* dans notre livre; nous avons simplement signalé sa présence dans le nord-est (une localité dans les Ardennes d'après H. Devriese, trois en Lorraine à confirmer). En 2022, nous l'avons observé à six reprises dans la pointe de Givet (Ardennes) sur les communes de Monthermé, les Mazures et Haybes (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer & J.-M. Weiss).

- ***Rubus hoplotheca* A.Beek & D.F.Mercier** : il s'agit du nouveau nom pour *R. radulooides* (W.M.Rogers) J.W.White (Van de Beek & Mercier, 2021). Observé dans les Ardennes en 2022.

- ***Rubus nigricans* Danthoine** : il s'agit du nom correct pour *R. pedemontanus* Pinkw. (= *R. bellardii* sensu Weihe et auct.). Danthoine a décrit cette espèce en 1791, à partir d'échantillons provenant du massif de la Grande Chartreuse; ses écrits longtemps oubliés ont été réhabilités récemment par Van de Beek (2019).

Espèces nouvelles pour le nord-est

- ***Rubus ambigenus* (Boulay) Boulay** (= *R. hermes* Matzk.): observé dans les Ardennes, aux Mazures en 2022 (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).
- ***Rubus fasciculatiformis* H.E.Weber**: nouveau pour la France, trouvé à Wissembourg dans le Bas-Rhin, sur un coteau calcaire xérophile dans une lisière forestière au-dessus de la Villa Alfred en 2022 (J.-M. Royer). Observé également à Bobenthal (Allemagne) à proximité de Wissembourg.
- ***Rubus holochlous* Sudre**: observé dans les Ardennes, à Hargnies, dans trois sites différents en 2022 (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer & J.-M. Weiss).
- ***Rubus obscurus* P.-J. Müll. non Kaltenb.** (= *R. subtercanens* WCR. Watson?): retrouvé dans le Bas-Rhin à Wissembourg, au col du Pigeonnier en 2022 (J.-M. Royer & J.-M. Weiss). Vraisemblablement un biotype local. Il n'est pas du tout certain qu'il se rapporte à *R. subtercanens* connu seulement des Îles britanniques (Kurtto *et al.*, 2010).
- ***Rubus rivularis* P.-J. Müll. & Wirtgen**: observé dans les Ardennes aux Mazures en 2022 (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer & J.-M. Weiss).
- ***Rubus senticosus* Köhler ex Weihe**: nouveau pour la France, trouvé en Haute-Marne aux Rus de Halas à Anglus en 2021 (J.-M. Royer). Dans ce secteur de sables acides contigu au site des Terres Blanches à Sauvage-Magny nous avons trouvé *R. integribasis*, *R. pllicatus*, *R. divaricatus*, *R. silvaticus*, *R. umbrosus*, *R. nessesensis* et *R. sulcatus*. Cartographié en Belgique, en Allemagne centrale et septentrio-

nale, ainsi que dans les Pays-Bas (Kurtto *et al.*, 2010).

- ***Rubus wahlbergii* Arrhenius**: nouveau pour la France, existe en Saône-et-Loire à Autun, chemin du Chêne (Lucand, 1890, Ass. Rub. N° 1191). Trouvé récemment par J.-M. Royer à Roussillon-en-Morvan à l'ouest du Château en 2012. Nous avons envoyé le scan de la planche d'herbier de l'Association Rubologique à W. Jansen, batologue allemand qui connaît bien cette espèce et qui nous a confirmé qu'il s'agit bien de *R. wahlbergii*. Les deux localités de Saône-et-Loire constituent un petit îlot (30 km de diamètre) éloigné de l'aire de l'espèce centrée sur le Danemark, le sud de la Suède et de la Norvège, avec des localités en Pologne, en Allemagne orientale et en Tchéquie (Kurtto *et al.*, 2010).

Localités nouvelles d'espèces rarement citées dans le nord-est

- ***Rubus adenantoides* Sudre in Gand.**: Haute-Saône, nous avons indiqué ce taxon comme étant un biotype. En réalité c'est une micro-endémique qui présente une aire de répartition d'un diamètre d'au moins 10 km dans les Vosges du sud où nous l'avons récolté à Ronchamp (route de Malbouhans, Puy-Sainte-Marie), Champagny (zone industrielle, caserne des Pompiers), Fresse et Ternuay (sortie du village). Un taxon très proche existe à Montigny-le-Roi en Haute-Marne.
- ***Rubus bracteosus* Weihe ex Lejeune**: Ardennes, observé dans huit sites en 2022 à Hargnies, Linchamp, les Mazures, Monthermé, Haybes (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).
- ***Rubus fissipetalus* P.-J. Müll.**: Bas-Rhin, revu à Wissembourg en

2022 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss, F. Vernier 2022); Haguenau dans la forêt domaniale, Zinswiller (Untermühlthal), Niedersteinbach (Engental), Obersteinbach (Fritsch & Matzke-Hayek, 2010, com. écrite).

- ***Rubus flaccidus* P.-J. Müll.**: Bas-Rhin, Haguenau dans la forêt domaniale, entre Haguenau et Mertzviller (Fritsch & Matzke-Hayek, 2010, com. écrite).
- ***Rubus gratiosus* P.-J. Müll. & Lefèvre**: Ardennes, observé dans huit sites en 2022 à Hargnies, Linchamps, Hautes-Rivières, les Mazures, Joigny-sur-Meuse, Monthermé (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).
- ***Rubus gravetii* (Boulay) W.C.R. Watson**: Ardennes, observé dans douze sites en 2022 à Haybes, Hargnies, Hautes-Rivières, les Mazures, Joigny-sur-Meuse, Monthermé, Linchamps (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).
- ***Rubus hemistemon* P.-J. Müll. ex Boulay**: Vosges, retrouvé dans son *locus typicus* à Saint-Gorgon en 2022 au niveau de l'allée centrale de la forêt domaniale où il est beaucoup plus rare qu'à l'époque de Boulay (J.-M. Royer, J.-M. Weiss).
- ***Rubus insectifolius* Lefèvre & P.-J. Müll.**: Ardennes, observé dans trois sites en 2022 à Hargnies et aux Mazures (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).
- ***Rubus louettensis* (Sudre & Gravet) Prain**: Ardennes, observé dans huit sites en 2022 à Haybes, Hargnies, Hautes Rivières, les Mazures, Linchamps (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).
- ***Rubus morifolius* P.-J. Müll.**: Meuse, observé à Vaudeville-le-Haut en 2018 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss); Meurthe-et-Moselle en 2020 à Mousson dans le bois communal, Viéville-en-Haye (J.-M.

Royer, J.-M. Weiss, M. Michelet); Moselle à Ricrange au nord-ouest de Boulay (Fritsch & Matzke-Hayek, 2010, com. écrite).

- ***Rubus perlongus* H. E. Weber & W. Jansen** : Doubs, observé a Foucherans au lieu-dit Courbotte dans une coupe forestière en 2014 (Y. Ferrez, détermination confirmée par le descripteur W. Jansen).
- ***Rubus rosaceus* Weihe**: Ardennes, observé dans trois sites en 2022 à Hargnies et les Mazures (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).

Cartes modifiées

Légende des cartes



Présence probable dans le département, à confirmer



Présence ancienne attestée dans le département



Présence confirmée dans le département, moins de dix localités connues




Présence confirmée dans le département, dix localités, ou plus, connues

- ***Rubus acutidens* (Boulay) Sudre**: nouveau pour la Côte d'Or, à Saulieu en 2020 en forêt domaniale (J.-M. Royer).



▲
Rubus acutidens

- ***Rubus albiflorus* Boulay & Lucand**: nouveau pour l'Yonne, observé à Quarré-les-Tombes en 2020 aux rochers de la Pérouse (J.-M. Royer).



▲
Rubus albiflorus

- ***Rubus ambulans* Matzk.**: nouveau pour l'Aube, observé dans la forêt communale de Eaux-Puiseaux en 2022 (J.-M. Royer, P. Lanfant).



▲
Rubus ambulans

- ***Rubus amphichloros* P.-J. Müll.**: nouveau pour la Haute-Saône, observé à Champagny au Mont de Mavou) (Royer *et al.*, 2019) et à Fougerolles (herbier Didier, MNHN).




▲
Rubus amphichloros

- ***Rubus atrovirens* P.-J. Müll.**: nouveau pour la Marne, observé à Chatrices en 2021 (J.-M. Royer).




▲
Rubus atrovirens

- ***Rubus bertramii* G. Braun**: nouveau pour la Meuse, observé à Florent-en-Argonne en 2021 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss).



▲
Rubus bertramii

- ***Rubus bicolor* Opiz**: fréquent dans la Meuse et la Meurthe-et-Moselle, où plus de dix localités sont citées. Dans la Meuse: Labeuville, Cumières, Brabant-sur-Meuse, Gondrecourt, Montier-sur-Saulx, Neuilly-en-Argonne, etc. En Meurthe-et-Moselle: Othe, Flabeuville, Gerbeviller, Vannes-le-Châtel, Viéville-en-Haye, Charmes-la-Côte, etc.



▲
Rubus bicolor

– ***Rubus canaliculatus* P.-J. Müll. :** fréquent dans le Jura, notamment dans la Bresse où plus de dix localités sont citées (Royer *et al.*, 2019).



▲
Rubus canaliculatus

– ***Rubus chlorostachys* P.-J. Müll. :** fréquent dans les Vosges, où plus de dix localités sont citées par exemple à Charmes, Gérardmer, Saint-Gorgon, Rambervillers, Rochesson, Grandvilliers, etc.



▲
Rubus chlorostachys


– ***Rubus collicola* (Sudre) Bouvet :** nouveau pour l'Aube, observé à Gyé-sur-Seine, le Replat de la Haie et les Corvées à proximité de l'ancienne voie ferrée; à Essoyes, les Trois Baillages en 2022 (P. Lanfant).



▲
Rubus collicola


– ***Rubus condensatus* P.-J. Müll. :** nouveau pour la Marne observé à Florent-en-Argonne (route de Moirmont) en 2021 (H. Devriese, J.-M. Royer, J.-M. Weiss); fréquent dans la Meuse, la Moselle et l'Aube avec plus de dix localités observées. En Meuse: Montier-sur-Saulx (ouest d'Ecurey) Lachalade, Joinville-en-Woëvre, Haumont-lès-Lachaussée, Vigneulles-lès-Hatonchâtel, Saint-Benoît-en-Woëvre, etc. En Moselle:

Metzeresche, Moyeuve-Grande (Froidcul), Avril, Neufchef, Bitche, Omersviller, Sarreguemines, Bliesbruck, Saint-Avold, etc. Dans l'Aube: Bucey-en-Othe (bois Chevans) Fontvannes (bois Mouvant), Saint-Mards-en-Othe (halte communale), Juvancourt, Villadin, Nogent-en-Othe, Macey, Planty, Paisy-Cosdon).




▲
Rubus condensatus

– ***Rubus confinis* P.-J. Müll. ex F.-W. Schultz :** nouveau pour la Moselle, observé dans le bois entre Kemplich et Metzervisse (Fritsch & Matzke-Hayek, 2010, com. écrite). Fréquent en Haute-Marne avec plus de dix localités observées: Chamarandes (à l'est), Chaumont (la Vendue), Neuilly-sur-Suize, Leuchey, Odival (Mont du Saussis) Verbiesles (plateau au nord) Froncles (bois de Buxières), Vignory).



▲
Rubus confinis

- ***Rubus conspicuus* P.-J. Müll.** : nouveau pour la Saône-et-Loire, observé à Autun (les Rivaux) en 2022 (J.-M. Royer).




▲
Rubus conspicuus

- ***Rubus constrictus* Lefèvre & P.-J. Müll.** : nouveau pour les Ardennes, observé à Guignicourt-sur-Vence en 2022 (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).




▲
Rubus constrictus

- ***Rubus cuspidatus* P.-J. Müll.** : fréquent en Moselle, où plus de dix localités sont citées : Sierck-les-Bains, Boulay, Creutzwald, Saint-Avold, Sarreguemines, Loutzville, Breidenbach, Bitche, Avril, etc.




▲
Rubus cuspidatus

- ***Rubus devitatus* Matzk.** : nouveau pour l'Aube, observé à Estissac dans la vallée de la Vanne en 2021 (J.-M. Royer, M. Michelet).




▲
Rubus devitatus

- ***Rubus discoideus* P.-J. Müll. ex Genev.** : confirmé pour l'Aube, observé à Bérulle dans la vallée du Fond de Céant en 2022 (J.-M. Royer).



▲
Rubus discoideus

- ***Rubus distractus* P.-J. Müll. ex Wirtg.** : nouveau pour les Ardennes et pour l'Yonne. Dans les Ardennes observé à Signy l'Abbaye dans la forêt domaniale en 2022 (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss). Observé dans l'Yonne à Quarré-les-Tombes à l'étang des Griottiers en 2021 (J.-M. Royer).



▲
Rubus distractus

- ***Rubus divaricatus* P.-J. Müll.** : nouveau pour la Haute-Marne, observé à Sauvage-Magny aux Terres Blanches, à Anglus aux Rus de Halas en 2021 et 2022 (J.-M. Royer, M. Michelet, J.-M. Weiss).



▲
Rubus divaricatus

– ***Rubus drymophilus* P.-J. Müll. & Lefèvre**: nouveau pour la Côte d'Or, observé à Gurgy-la-Ville le long de la route de Lucey en 2021 (J.-M. Royer, M. Michelet). Fréquent en Haute-Marne où plus de dix localités sont observées: Angoulaincourt, Soulaincourt, Colombey au bois de la Lune, Châteauvillain à Rouville, Bussières-lès-Belmont, Brottes dans la forêt du Corgebin, Laneuville au bois de la Tremont, Enfonvelle, etc.




▲
Rubus drymophilus

– ***Rubus echinosepalus* H.E. Weber**: nouveau pour l'Aube, observé aux Riceys à Valussot en 2022 (P. Lanfant).



▲
Rubus echinosepalus


– ***Rubus elegans* P.-J. Müll.**: nouveau pour la Moselle, observé à Forbach à l'ouest de Spicheren (Fritsch & Matzke-Hayek, 2010, com. écrite).



▲
Rubus elegans


– ***Rubus flaccidifolius* P.-J. Müll.**: nouveau pour la Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Haut-Rhin, confirmé pour le Bas-Rhin. Dans la Marne: Florent-en-Argonne le long de la route de Moirmont en 2021 ((H. Devriese, J.-M. Royer, J.-M. Weiss), Troisfontaines à Boivine et les Etocs en 2022 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss). Dans le Bas-Rhin: retrouvé à Wissembourg en 2022 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss, F. Vernier). Dans le Haut-Rhin: Lautenbachzell

à Belchenseeback en 2022 (H. Tinguy), au col de la Schlutt en 2022 (A. Bizot). En Meurthe-et-Moselle: Sponville dans le bois de Sponville en 2022 (J.-M. Weiss).




▲
Rubus flaccidifolius

– ***Rubus foliosus* Weihe ex Bluff & Fingerh.**: confirmé pour les Ardennes et retrouvé dans le Bas-Rhin. Ardennes: Rimogne à étang Doby en 2012 (J.-M. Royer). Bas-Rhin: Wissembourg en 2022 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss, F. Vernier).



▲
Rubus foliosus

– ***Rubus fonsmatronae* J.-M. Royer**: présence probable dans l'est de l'Aube, observé à Colombey-les-deux-Eglises à 500 m de l'Aube en 2022 (J.-M. Royer).




▲
Rubus fonsmatronae

– ***Rubus godronii* Lecoq & Lamotte**: nouveau pour le Haut-Rhin, observé à Hirtzfelden dans la forêt du Niederwald et à Heiteren dans la forêt du Hartwald en 1999 (R. Treiber, déterm. H. E. Weber).



▲
Rubus godronii

– ***Rubus grabowskii* Weihe in Günther et al. sensu lato**: nouveau pour le Bas-Rhin, observé à Reichsfeld (Steinweg) en 2022 (H. Tinguy).



▲
Rubus grabowskii s.l.

– ***Rubus gymnocarpus* Boulay & Pierrat**: nouveau pour l'Aube, observé à Saint-Phal à la Cayfarde dans un sous-bois sur sol acide en 2022 (P. Lanfant).




▲
Rubus gymnocarpus

– ***Rubus hoplotheca* Beek & D.F. Mercier**: nouveau pour les Ardennes, observé à Évigny en 2022 (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).



▲
Rubus hoplotheca

– ***Rubus integribasis* P.-J. Müll. ex Boulay**: nouveau pour la Meuse, observé à Beaulieu-en-Argonne, le long de la route des Étangs et à la carrière de gaize en 2022 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss).




▲
Rubus integribasis

– ***Rubus intricatus* P.-J. Müll.**: nouveau pour le Bas-Rhin, observé à Niedersteinbach, Obersteinbach (Fritsch & Matzke-Hayek, 2010, com. écrite).



▲
Rubus intricatus

– ***Rubus loehrii* Wirtg.** : fréquent en Moselle, plus de dix localités observées, à Bitche, Saint-Avold, Forbach, Carling, Boulay, Avril, Vionville, Rozeurieuilles, Gorze, etc.




▲
Rubus montanus

– ***Rubus mucronipetalus* P.-J. Müll.** : nouveau pour le Bas-Rhin, observé à Albe au col de l'Ungersberg en 2022 (H. Tinguy).



▲
Rubus nemorosus

– ***Rubus nigricans* Danthoine** : nouveau pour la Marne, observé à Florent-en-Argonne le long de la route de Moirmont en 2021 (H. Devriese, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).




▲
Rubus loehrii

– ***Rubus montanus* Lib. ex Lej.** : nouveau pour le Bas-Rhin, observé à Wissembourg en 2022 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss, F. Vernier).




▲
Rubus mucronipetalus

– ***Rubus nemorosus* Hayne ex Willd.** : nouveau pour la Meuse et la Nièvre. Meuse à Beaulieu-en-Argonne en 2022 (J.-M. Royer et J.-M. Weiss). Nièvre à Brassy en 2019 (J.-M. Royer, Y. Ferrez, J.-M. Weiss et G. Causse).



▲
Rubus nigricans

– ***Rubus ninckii* (Sudre) C.-K. Schneid.** : nouveau pour la Meurthe-et-Moselle, observé à Flabeuville au bois de la Côte en 2022 (J.-M. Weiss). Fréquent dans la Meuse avec plus de dix localités : Beaulieu-en-Argonne, Brabant-en-Argonne, Valdelaincourt au bois de la Côte, Neuilly-en-Argonne dans la carrière, Clermont-en-Argonne, Lachalade au monument et dans la forêt du Grand Tige, Rarécourt, etc.



▲
Rubus ninckii

– ***Rubus orbifolius* Lefèvre ex Boulay**: nouveau pour la Nièvre et l'Yonne. Nièvre: observé à Dun-les-Places. Yonne: observé à Quarré-les-Tombes aux rochers de la Pérouse et à Saint-Léger-Vauban à la Pierre-qui-Vire en 2021 (J.-M. Royer).



▲
Rubus orbifolius

– ***Rubus orthostachys* G. Braun**: nouveau pour la Meuse, observé à Gondrecourt-le-Château dans la forêt de Vau en 2020 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss), à Mongiennes et Deuxmonts-aux-Bois en 2021 (J.-M. Weiss).



▲
Rubus orthostachys


– ***Rubus pallidicaulis* Boulay & J.-B. Cornet**: nouveau pour l'Yonne et les Vosges. Yonne: observé à Quarré-les-Tombes et à Saint-Léger-Vauban à la Pierre-qui-Vire en 2011 (J.-M. Royer); Vosges: observé à Saulxures-sur-Moselotte en 2021 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss). Fréquent dans la Nièvre, plus de dix localités: Brassay, Montsauche, Saint-Brisson à la forêt de Breuille-Chenu, Dun-les-Places, Saint-Agnan sur la rive est du lac, Anost au Chassery, Prémercy, etc.



▲
Rubus pallidicaulis

– ***Rubus phyllostachys* P.-J. Müll.**: nouveau pour la Côte d'Or, observé à Molesmes, Gurgy-la-Ville (limite

de Rouvres), les Goulles en 2021 et 2022 (J.-M. Royer, M. Michelet).




▲
Rubus phyllostachys

– ***Rubus plicatus* Weihe & Nees**: nouveau pour le Doubs, observé à la Vèze au bois d'Aglans en 2015 (Y. Ferrez).




▲
Rubus plicatus

– ***Rubus procerus* P.-J. Müll. ex Boulay**: fréquent dans la Marne, plus de 10 localités: Troisfontaines à Boivine, Merfy, Mailly-Champagne, Chenay, Pouillon, Gigny-Bussy, etc.




▲
Rubus procerus

– ***Rubus pulcher* P.-J. Müll. & Lefèvre**: nouveau pour les Ardennes, observé dans la forêt de Signy-l'Abbaye en 2022 (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss).




▲
Rubus pulcher

– ***Rubus radula* Weihe ex Boenn.**: confirmé pour la Moselle, observé à Omersweiler au nord-ouest de Bitche (Fritsch & Matzke-Hayek, 2010, comm. écrite) et à Boulange dans une haie vers le cimetière en 2021 (J.-M. Weiss, déterm. H. Devriese).



▲
Rubus radula

– ***Rubus rhombicus* H.E. Weber**: nouveau pour l'Aube, observé à Gyé-sur-Seine, le Replat de la Haie et les Corvées à proximité de l'ancienne voie ferrée en 2022 (P. Lanfant). Fréquent en Côte d'Or et en Haute-Marne, plus de dix localités. Côte d'Or: observé à Molesmes, Châtillon-sur-Seine, Gurgy-la-Ville (limite de Rouvres), Pasques, les Gouilles, Val Suzon, Recey-sur-Ource, Saint-Germain-le-Rocheux, etc. Haute-Marne: observé à Roches-Bettancourt dans la forêt du Pavillon, Chaumont au Val Barizien, Luzy au bois Millet, Verbiesles sur le plateau au nord, Luzy au Poirier Tondou, Froncles au bois de Buxières, Arc-en-Barrois à la lisière domaniale sud, Coupray, Arbot, Lanty-sur-Aube, etc.



▲
Rubus rhombicus

– ***Rubus rotundifolius* Sudre**: nouveau pour la Marne et la Haute-Marne. Marne: observé dans la forêt de Trois-Fontaines en 2022 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss). Haute-Marne: observé à Piépage dans le bois communal en 2021 (J.-M. Royer, M. Michelet).




▲
Rubus rotundifolius

– ***Rubus rudis* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh.**: nouveau pour le Haut-Rhin, observé à Wolfgantzen dans la forêt domaniale de Kastenwald, Dessenheim, Widensohlen en 1999 (R. Treiber, déterm. H.E. Weber). Fréquent dans les Vosges, plus de dix localités: Vittel, Grand au bois des Gourseaux, Chermisay, Bulgneville au sud de Grande Tranche, Maxey-sur-Meuse, Liffol-le-Grand, Rollainville, etc.



▲
Rubus rudis

– ***Rubus saluum* Focke ex Grelli** : nouveau pour les Ardennes et le Bas-Rhin. Ardennes : observé à Évigny au Franc Bois en 2022 (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss). Bas-Rhin : observé à Wissembourg en 2022 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss, F. Vernier). Fréquent dans l'Aube et les Vosges, plus de dix localités. Aube : Souigny dans la forêt communale, Amance, la Ville-au-Bois, Bucey-en-Othe dans le bois Chevans et le bois de Charmes, Fontvannes dans le bois Mouvant, Saint-Mards-en-Othe à la halte communale, Nogent-en-Othe au bois de Coulours, etc. Vosges : Sapois, Grand dans le bois des Gourseaux, Mont-les-Neufchâteau à Bourlémont, Bulgneville au sud de Grande Tranche, Saulxures-lès-Bulgnéville à la Bugueille, Saint-Ouen-lès-Parey au bois communal, Taintrux, Saulcy-sur-Meurthe, Senones, Pierrepont-sur-l'Arentèle, etc.



▲
Rubus saluum

– ***Rubus scabrosus* P.-J. Müll.** : nouveau pour la Meuse et les Vosges. Meuse : observé à Billy-les-Mangiennes en 2021 (J.-M. Weiss). Vosges : retrouvé à Saint-Gorgon, carrières de Métendal en 2018 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss).




▲
Rubus scabrosus

– ***Rubus scissus* W.C.R. Watson** : fréquent dans les Ardennes, plus de dix localités : Gué-d'Hossus, Monthermé, Thilay, le Châtelet-sur-Sormonne, les Mazures, Joigny-sur-Meuse, Haybes, Hargnies, Linchamps, etc. (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss, observations 2022).




▲
Rubus scissus

– ***Rubus silvaticus* Weihe & Nees** : nouveau pour la Meuse et l'Yonne ; Meuse : Beaulieu-en-Argonne, au-dessus du Saut de la Carpe, dans une myrtille-boulaie en 2022 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss, confirm. H. Devriese et D. Mercier). Yonne : Branches, à l'est de l'aérodrome en 2009 (J.-M. Royer).



▲
Rubus silvaticus

– ***Rubus spina-curva* Boulay & Gillot** : confirmé pour l'Aube, observé à Planty dans une haie, Saint-Mards-en-Othe le long de la route de Nogent, Palis le long du chemin de Serbillon, Paisy-Cosdon à la gravière (J.-M. Royer, récoltes anciennes, déterm. 2022).



▲
Rubus spina-curva

– ***Rubus tereticaulis* P.-J. Müll.** : nouveau pour la Marne et le Haut-Rhin. Marne : Florent-en-Argonne le long de la route de Moirmont en 2021 (H. Devriese, J.-M. Royer, J.-M. Weiss). Haut-Rhin : Hirtzfelden dans la forêt du Rothleible, Rixheim dans la forêt de la Harth en 1999 (R. Treiber, déterm. H.E. Weber). Moselle, fréquent plus de dix loca-

lités : Rezonville, Gorze, Tronville, Ancy-sur-Moselle, Ars-sur-Moselle, Saint-Avold, Creutzwald, etc.



▲
Rubus tereticaulis


– ***Rubus ulmifolius* Schott** : fréquent dans la Marne, plus de dix localités, notamment dans la Montagne de Reims et la Champagne humide, par exemple à Giffaumont, Merfy, Larzicourt, Chenay, Pouillon, Drosnay, etc.



▲
Rubus ulmifolius

– ***Rubus uncinatus* P.-J. Müll.** : nouveau pour la Moselle, confirmé pour le Bas-Rhin. Moselle, observé à Bitche dans le bois au nord-ouest de Schorbach, Carling dans le bois vers Diesen (Fritsch & Matzke-Hayek, 2010, com. écrite). Bas-Rhin : Haguenau dans la forêt

domaniale), Zinswiller (Fritsch & Matzke-Hayek, 2010, comm. écrite).



▲
Rubus uncinatus


– ***Rubus velutinus* Vest ex Tratt.** : nouveau pour les Ardennes, la Marne et la Moselle. Ardennes, observé à Signy-l'Abbaye dans la forêt domaniale en 2022 (H. Devriese, Y. Ferrez, J.-M. Royer, J.-M. Weiss). Marne, observé à Florent-en-Argonne le long de la route de Moirmont, Troisfontaines à Bovine en 2021 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss). Moselle, observé à Moyeuivre-Grande à Froidcul en 2020 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss, M. Michelet).



▲
Rubus velutinus

– ***Rubus vestitus* Weihe & Nees ex Bluff & Fingerh.** : nouveau pour

le Bas-Rhin, observé à Huttenheim, Lutzelhouse en 2022 (H. Tinguy). Fréquent en Moselle, plus de dix localités : Woippy, Gorze, Guintrange, Laissy, Novéant-sur-Moselle, Chatel-Saint-Germain, Remilly, Fameck, Hombourg-Budange, Metzeresche, Avril, Moyeuivre-Grande, etc.



▲
Rubus vestitus

– ***Rubus weissii* Ferrez & J.-M. Royer** : nouveau pour la Marne, observé à Troisfontaines à les Etocs en 2021 (J.-M. Royer, J.-M. Weiss).



▲
Rubus weissii

☛ Remerciements

Nous remercions P. Lanfant, H. Tinguy et J.-M. Weiss qui

nous ont communiqué leurs observations des années 2021 et 2022, ainsi que H. Devriese, D. Mercier et W. Jansen qui nous ont aidés pour la détermination de certains taxons critiques.

Van de Beek A & Mercier DP 2021. *Rubus hoplotheca* A.Beek & D.P.Mercier, a replacement name for *Rubus raduloides* (W.M. Rogers) J.M. White (Rosaceae). *Dumorteria* **119**: 31-32.

Bibliographie

Ferrez Y & Royer J-M, 2021. Le genre *Rubus* dans le nord-est de la France. Description, détermination, écologie et phytosociologie. SBFC, CBNFC-ORI, Greffe.

Jansen W, 2021. *Rubi hassici* – Die Brombeeren Hessens. Kochia beiheft 2.

Kurto A, Weber HE, Lampinen R & Sennikov AN, 2010. *Atlas Florae Europaeae*, 15, *Rosaceae (Rubus)*, Helsinki.

Royer J-M, Ferrez Y & Weiss J-M, 2019. Observations complémentaires sur les *Rubus* du nord-est de la France (note 3). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest NS* **50**: 70-82.

Treiber R, 1999. Pflanzensoziologische, bodenkundliche und nutzungsgeschichtliche Untersuchungen zur Entwicklung von Trockenrasen-Gesellschaften der südsäsischen Harth (Frankreich, Haut-Rhin). *Tuexenia* **19**: 305-342

Van de Beek A, 2019. Two old Blackberries (*Rubus* L., *Rosaceae*) from the region of the Chartreuses in South-East France. *Gorteria Dutch Botanical Archives* **41** (1): 53-67.

