



Floristic survey of the Furnas Gêmeas region, Campos Gerais National Park, Paraná state, southern Brazil

Anna L. P. Andrade,^{1,2} Rosemeri S. Moro,¹ Yoshiko S. Kuniyoshi,² Marta R. B. do Carmo¹

¹Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Biologia Geral, Av. Carlos Cavalcanti, 4748, Uvaranas, CEP 84030-690, Ponta Grossa, PR, Brazil. ² Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, Av. Pref. Lothário Meissner, 900, Jardim Botânico, CEP 80210-170, Curitiba, PR, Brazil.

Corresponding author: Marta R. B. do Carmo, mrcarmo@uepg.br

Abstract

To investigate the resilience of the grassland flora of the Campos Gerais phytogeographic zone, this study surveys the phanerogamic plant species occurring in the Furnas Gêmeas area (Campos Gerais National Park, Paraná state, southern Brazil), especially those resilient to fragmentation by crops and fire. Collections were made monthly from October 2002 to May 2004 and occasionally from 2005 to 2013. In total, 313 species belonging to 70 angiosperm families and 2 gymnosperm families were collected. Just 4 angiosperm taxa were not determined to species. Although the Furnas Gêmeas has suffered from very evident anthropogenic changes, the vegetation retains part of its original richness, as seen in better-preserved areas outside the park. Included in our list are endangered species that need urgent measures for their conservation.

Key words

Paraná Flora; grassland; remaining natural vegetation; resilient species; Campos Gerais phytogeographic zone

Academic editor: Gustavo Hassemer | Received 22 October 2015 | Accepted 15 August 2017 | Published 1 December 2017

Citation: Andrade ALP, Moro RS, Kuniyoshi YS, Carmo MRB (2017) Floristic survey of the Furnas Gêmeas region, Campos Gerais National Park, Paraná state, southern Brazil. Check List 13 (6): 879–899. <https://doi.org/10.15560/13.6.879>

Introduction

In Paraná state, Brazil, in the phytogeographic zone known as Campos Gerais (Maack 1948), there are several natural round depressions formed by sandstone collapse, the *furnas*, which specifically occur in outcrop areas of the Furnas Formation in the intracratonic Paraná Basin (Soares 1989). These depressions generally have water or dense vegetation inside (Soares 1989) and above them occurs natural grassland vegetation in a mosaic with *Araucaria* temperate forest patches. Among the 14 known *furnas* in the Campos Gerais region (Soares 1989), 3 are within Campos Gerais National Park (CGNP).

The Campos Gerais native vegetation is threatened by

its intense replacement to crops or pine plantations (Ziller 2000, Melo et al. 2007), which prevent native grasses from surviving and can lead to degradation of fragile soils (Pillar 2006, Dalazoana 2010). Thus, the Brazilian government has considered the region conservation as priority (MMA 2007).

Studies in the Campos Gerais phytogeographic zone have shown a high species richness that includes rare and endangered species (Cervi et al. 2007, Nanuncio and Moro 2008, Dalazoana 2010, Ritter et al. 2010, Andrade et al. 2011, Mioduski and Moro 2011, Carmo et al. 2012, Carmo and Assis 2012, Moro et al. 2012). However, all of these studies were undertaken in relatively well-




Figure 1. Location of the study site in Furnas Gêmeas, Campos Gerais National Park, Paraná state, Brazil.

preserved landscapes. In impacted areas, the flora is little known, and thus, an assessment of species resilience to anthropogenic changes is required.

We choose an area in the CGNP that has undergone anthropogenic changes, including annual cropping, burning, and development for recreation (hiking routes). Even so, the Furnas Gêmeas site still preserves much of its native vegetation. We investigated the presence of resilient species by comparing the Furnas Gêmeas floristic list to those of four more intact areas outside of the CGNP, which we considered reference areas.

Methods

Study site. With an area of 21,500 ha, CGNP is located in the municipalities of Ponta Grossa, Castro, and Carambeí, Paraná, southern Brazil. This national park was created in March 2006 with the aim to preserve some of the last remnants of natural grasslands and their rich flora and fauna. These grasslands were traditionally exploited for livestock, but in recent decades, they are being replaced by crops and pine plantations (Brasil 2008).

We conducted the study at Furnas Gêmeas (FG) in CGNP (Fig. 1), that comprises 2 caves, 22 km away from Ponta Grossa ($25^{\circ}08'46''$ S, $049^{\circ}05'7''$ W) (SAD69).




Figure 2. The insides and surroundings of the furnas. **A, B.** Furna 1. **C, D.** Furna 2.

Furna 1 (80 m wide \times 50 m deep) and Furna 2 (17 m wide \times 53 m deep) are separated by a small 60–100 m strip of land (Soares 1989). Trees that are typical of Araucaria forest occur inside of these furnas; outside of them, grassland vegetation prevails among the outcrops of sandstone (Fig. 2).

The climate of CGNP is Cfb (Altitudinal Subtropical Humid) according to the Koeppen classification, with a




Figure 3. The 50 × 50 m grid to locate the species sampled in *Furnas Gêmeas*, Campos Gerais National Park, Paraná state, Brazil.

mean annual temperature of 17.6 °C (range: 16–22 °C; Cruz 2007).

According to Embrapa (2008), the shallow young soils are mainly lithosols (*Neossolos litólicos*), regosols (*Neossolos Regolíticos*), and haplic cambisols (*Cambissolos hápicos*), with frequent rocky outcrops that are very susceptible to erosion (Melo et al. 2007). Until the 1970s, the main economic activity in the region was cattle ranching on native grasslands, but crops under no-tillage system have replaced ranching. More recently, monocultures of pine have been planted on most non-farmable land (Ziller 2000).

Data collection. In order to record plants in a spatial scale we used a 50 × 50 m grid, placed over an aerial image of the study area, using ArcGIS 10.3 and the basemap of the ArcGIS Online (Fig. 3). We visited the study area monthly from October 2002 to May 2004 (totaling 20 months), and sporadically from 2005 to 2013, collecting phanerogamic plant specimens in their reproductive state.

We follow the standard procedures for preparing botanic material (Fidalgo and Bononi 1984) and deposited vouchers in the HUPG herbarium. Identifications were made by consulting the literature and collections of the HUPG, MBM and UPCB herbaria (acronyms according to Thiers 2016).

The taxonomic classification of angiosperms follows APG IV (2016), and of gymnosperms, Bowe et al.

(2000). Species and author names are in accordance to *The International Plant Names Index* (IPNI). Taxa were classified according to:

- (1) Life-forms (following Raunkiaer 1934, adapted by Mueller-Dombois and Ellenberg 1974): chamaephyte, geophyte, hemicryptophyte, phanerophyte, therophyte, liana, epiphyte, and parasite.
- (2) Dispersion syndrome (following morphological criteria proposed by van der Pijl 1982): zoochoric, anemochoric, autochoric, and unknown.
- (3) Invasion status (following Pyšek et al. 2004): native, alien species, casual alien, naturalized, invasive, and transformers. Transformers are defined as a subset of invasive plants, not necessarily alien, that change the character, condition, form, or nature of ecosystems.

We checked the presence of threatened species according to the *Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção* (MMA 2014) and the *Lista vermelha de plantas ameaçadas de extinção no estado do Paraná* (Paraná 1995).

We compared the similarity of the flora of Furnas Gêmeas with well-preserved neighboring areas, based on published studies (Guartelá State Park: Carmo 2006; Vila Velha State Park, Cervi et al. 2007; Piraí da Serra, Nanuncio and Moro 2008; Pitangui Valley, Moro et al. 2012). We employed a 1782-species presence/absence matrix using Cluster Analysis (Ward's distance).

Table 1. Species in the Furnas Gêmeas, Campos Gerais National Park (CGNP), Paraná state, Brazil. L-F= Raunkiaer's life-forms, Ch = chamaephyte, G = geophyte, H = hemicryptophyte, Ph = phanerophyte, Th = therophyte, L = liana, E = epiphyte, P = parasite, DS = Dispersal syndrome, Ane = anemochoric, Zoo = zoothrophic, Aut = autochoric, Unk = unknown, * = species identified based on non-fertile specimens, Collector = number of collector MRBC, C = category of species (invasive and endangered status), Na = native, Al = alien species, We = weed, In = invasive, Tr = transformers, EV = endangered species-vulnerable, ER = endangered species-rare, CG = endemic species in the Campos Gerais, Location (related to square number shown in Figure 3).

Families, species	L-F	DS	Voucher	Coll.	C	Location	Reference
Araucariaceae							
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	Ph	Zoo	21,506	1871	Na, EV	7	Garcia 2002
Pinaceae							
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	Ph	Ane	21,507	1870	Al, In	21	Marchiori 1996
Acanthaceae							
<i>Dyschoriste hygrophiloides</i> (Ness) Kuntze	G	Aut	13,918	1302	Na	09/10	Silva 2011
<i>Ruellia multifolia</i> (Nees) Lindau	G	Aut	17,764	1608	Na, ER	10	Silva 2011
Amaranthaceae							
<i>Alternanthera brasiliensis</i> (L.) Kuntze	G	Aut	17,149	31	Na, Tr	10	Siqueira 2002, Senna 2015
<i>Pfaffia gnaphaloides</i> (L.f.) Mart.	G	Aut	17,145	1260	Na	19	Marchioretto et al. 2010
<i>Pfaffia tuberosa</i> (Spreng.) Hicken	G	Aut	17,141	1619	Na	10	Marchioretto et al. 2010
<i>Amaranthaceae</i> sp.	G	Aut	21,257	1848	Na	10	-
Amaryllidaceae							
<i>Hippeastrum psittacinum</i> Herb.	G	Aut	14,733	1232	Na	13	Dutilh 2005
<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn	G	Aut	14,516	19	Na, We	10	Dutilh 2005, Moreira and Bragança 2011
Anacardiaceae							
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Ph	Zoo	13,915	1559	Na	17	Luz 2011
<i>Schinus weinmannifolius</i> Engl.	Ph	Zoo	13,914	1648	Na	21	Luz 2011
Annonaceae							
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	Ph	Zoo	*	-	Na	21	Lobão et al. 2012
Apiaceae							
<i>Eryngium elegans</i> Cham. & Schlecht.	H	Aut	13,910	70	Na, Tr	15	Corrêa and Pirani 2005
<i>Eryngium horridum</i> Malme	H	Aut	13,911	1347	Na, Tr	19	Corrêa and Pirani 2005, Cota 2009
<i>Eryngium pristis</i> Cham. & Schlecht.	H	Aut	13,908	1459	Na	11	Corrêa and Pirani 2005, Cota 2009
Apocynaceae							
<i>Ditassa edmundoi</i> Fontella & Valente	L	Ane	17,140	1458	Na	11	Koch et al. 2015
<i>Mandevilla atroviridis</i> (Stadelm.) Woodson	L	Ane	13,906	93	Na	17	Sales 1993, Matozinhos and Konno 2011
<i>Mandevilla coccinea</i> (Hook. & Arn.) Woodson	G	Ane	*	-	Na, ER	09	Sales 1993, Sales and Kinoshita 2005
<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadelm.) A.H.Gentry	H	Ane	13,901	76	Na	13	Sales 1993, Sales and Kinoshita 2005
<i>Oxypetalum</i> sp.	L	Ane	13,903	1435	Na	10	-
Aquifoliaceae							
<i>Ilex theezans</i> Mart. ex Reissek	Ph	Zoo	13,900	1404	Na	15	Brotto et al. 2007
Araliaceae							
<i>Schefflera macrocarpa</i> (Cham. & Schlecht.) Frodin	Ph	Zoo	13,899	1282	Na	22	Fiaschi et al. 2007
Arecaceae							
<i>Allagoptera campestris</i> (Mart.) Kuntze	G	Zoo	14,603	1236	Na	19	Caxambú et al. 2015
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Ph	Zoo	*	-	Na	22	Caxambú et al. 2015
Asteraceae							
<i>Achyrocline satureoides</i> (Lam.) DC.	Ch	Ane	14,001	1723	Na, Tr	09/10/13	Moraes 1997, Hattori and Nakajima 2008
<i>Aspilia montevidensis</i> (Spreng.) Kuntze	Ch	Ane	14,039	1263	Na	15	Santos 1984
<i>Baccharis axillaris</i> DC.	Ch	Ane	17,157	1230	Na	10/13	Oliveira and Marchiori 2006b
<i>Baccharis calvecens</i> DC.	Ch	Ane	17,207	1639	Na	08	Hattori and Nakajima 2008
<i>Baccharis coridifolia</i> DC.	G	Ane	14,035	1701	Na, Tr	10	Fagundes et al. 2015
<i>Baccharis crispa</i> Spreng.	Ch	Ane	14,047	1702	Na, Tr	13	Moraes 1997, Hattori and Nakajima 2008, Heiden et al. 2009
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	H	Ane	14,034	1198	Na, Tr	17	Moraes 1997, Hattori and Nakajima 2008
<i>Baccharis linearifolia</i> (Lam.) Pers.	Ch	Ane	17,156	1163	Na	10/13	Hattori and Nakajima 2008
<i>Baccharis montana</i> DC.	Ch	Ane	17,176	1633	Na	21	Barroso 1957
<i>Baccharis oblongifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Ch	Ane	14,068	1185	Na	13	Oliveira and Marchiori 2005
<i>Baccharis pentodonta</i> Malme	H	Ane	17,154	1703	Na	10	Oliveira and Marchiori 2006a, Fernandes and Ritter 2009
<i>Baccharis punctulata</i> DC.	Ch	Ane	14,069	1714	Na	10	Moraes 1997, Fernandes and Ritter 2009, Heiden et al. 2012
<i>Baccharis tarchonanthoides</i> DC.	Ch	Ane	17,198	81	Na	10	Barroso 1957
<i>Baccharis vulneraria</i> Baker	Ch	Ane	14,759	1251	Na	21	Heiden et al. 2012
<i>Calea cuneifolia</i> DC.	H	Ane	17,161	8	Na	10/13	Mondin et al. 2015
<i>Calea parvifolia</i> (DC.) Baker	H	Ane	18,916	1770	Na	10	Pruski 2005
<i>Chaptalia integrerrima</i> (Vell.) Burkart	Ch	Ane	17,173	1333	Na, We	13	Hattori and Nakajima 2008, Pasini et al. 2014
<i>Chromolaena hirsuta</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	Ch	Ane	18,918	1778	Na	10/13	Esteves 2001

Table 1. Continued.

Families, species	L-F	DS	Voucher	Coll.	C	Location	Reference
<i>Chromolaena palmaris</i> (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	Ch	Ane	17,481	1547	Na	10	Cabrera and Klein 1980
<i>Chrysolaena platensis</i> (Spreng.) H.Rob.	Ch	Ane	14,042	1705	Na, Tr	10	Barroso 1957, Soares 2012
<i>Chrysolaena simplex</i> (Less.) Dematt.	Ch	Ane	17,211	14	Na	10	Hattori and Nakajima 2008, Soares 2012
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Th	Ane	19,696	1849	Al, In	10	Lorenzi 2008
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	H	Ane	14,073	1509	Na, We	10	Hattori and Nakajima 2008
<i>Disynaphia filifolia</i> (Hassl.) R.M.King & H.Rob.	Ch	Ane	14,863	1529	Na	10	King and Robinson 1971
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	Ch	Ane	14,830	1197	Na, We	10	Moraes 1997, Hattori and Nakajima 2008
<i>Gamochaeta falcata</i> (Lam.) Cabrera	Ch	Ane	19,738	1850	Na	10	Deble and Marchiori 2007
<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera	Ch	Ane	19,697	1851	Na, In	06/10/13	Barroso 1957, Deble and Marchiori 2007
<i>Gochnatia polymorpha</i> (Less.) Cabrera	Ph	Ane	14,071	1242	Na	04/14	Fernandes and Ritter 2009
<i>Grazielia multifida</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	H	Ane	13,998	1476	Na	06/10/13	Esteves 2001
<i>Gyptis pinnatifida</i> Cass.	Ch	Ane	6,620	79	Na	10	Esteves 2001
<i>Inulopsis scaposa</i> (DC.) O.Hoffm.	H	Ane	14,032	1233	Na	10/13	Barroso 1957
<i>Lessingianthus brevifolius</i> (Less.) H.Rob	Ch	Ane	17,169	1421	Na	10	Fagundes et al. 2015
<i>Lessingianthus intermedius</i> (DC.) Dematt	Ch	Ane	17,166	1499	Na	10	Beretta et al. 2008
<i>Lucilia acutifolia</i> (Poir.) Cass.	Ch	Ane	17,188	1375	Na	13	Fagundes et al. 2015
<i>Lucilia linearifolia</i> Baker	Ch	Ane	18,919	1779	Na	13	Barroso 1957
<i>Mikania banisteriae</i> DC.	L	Ane	14,038	1519	Na	11	Ritter et al. 2015
<i>Mikania hoffmanniana</i> Dusén	L	Ane	14,788	1243	Na	04	Cabrera and Klein 1989
<i>Mikania micrantha</i> Kunth	L	Ane	17,287	89	Na	06/10	Moraes 1997, Ritter and Miotto 2005
<i>Noticastrum calvatum</i> (Baker) Cuatrec.	Ch	Ane	17,164	1700	Na	10/13	Beretta et al. 2008
<i>Noticastrum sericeum</i> (Less) Less ex Phil.	Ch	Ane	17,215	46	Na	13	Philippi 1864
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	Ph	Ane	14,005	1748	Na	17	Grokoviski et al. 2009
<i>Piptocarpha regnellii</i> (Sch. Bip.) Cabrera	Ch	Ane	17,172	1679	Na	17	Grokoviski et al. 2009
<i>Pterocalon angustifolium</i> DC.	Ch	Ane	14,036	1490	Na	10/13	Lima and Matzenbacher 2008
<i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.	Th	Ane	14,066	1318	Na, We	22	Moraes 1997, Teles 2008, Oliveira et al. 2015
<i>Senecio grisebachii</i> Baker	Th	Ane	14,056	15	Na	10	Baker 1884
<i>Senecio oleosus</i> Vell.	Th	Ane	14,052	1170	Na	06	Teles 2008, Oliveira et al. 2015
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	Th	Ane	17,201	1735	Na, We	10	Beretta et al. 2008
<i>Stenocephalum megapotamicum</i> (Spreng.) Sch. Bip.	Ch	Ane	17,175	1704	Na	10/13	Hattori and Nakajima 2008, Moreira and Teles 2014
<i>Stevia</i> sp. 1	Ch	Ane	14,037	1710	Na	10	-
<i>Stevia</i> sp. 2	Ch	Ane	18,674	1721	Na	10	-
<i>Trixis nobilis</i> (Vell.) Katinas	Ch	Ane	17,286	1510	Na	10/13	Fernandes and Ritter 2009
<i>Vernonanthura crassa</i> (Vell.) H.Rob.	Ch	Ane	14,070	1206	Na	13	Robinson 1992
<i>Vernonanthura cuneifolia</i> (Gardner) H.Rob.	Ch	Ane	17,170	1193	Na	10	Soares 2012
<i>Vernonanthura nudiflora</i> (Less) H.Rob	Ch	Ane	17,180	1564	Na, Tr	10	Cabrera and Klein 1989
Asteraceae sp. 1	Ch	Ane	17,214	16	Na	10	-
Asteraceae sp. 2	Ch	Ane	14,072	49	Na	10	-
Asteraceae sp. 3	Ch	Ane	17,216	1625	Na	10	-
Asteraceae sp. 4	Ch	Ane	17,574	1316	Na	19	-
Berberidaceae							
<i>Berberis laurina</i> Billb.	Ph	Zoo	17,387	1359	Na	22	Pedralli 2002
Bignoniaceae							
<i>Amphilophium crucigerum</i> (L.) L.G.Lohmann	L	Ane	17,137	1400	Na	04	Villagra and Romanuc Neto 2011
Boraginaceae							
<i>Moritzia dusenii</i> I.M.Johnst.	H	Aut	14,598	21	Na	10	Ranga 2012
Bromeliaceae							
<i>Aechmea bromeliifolia</i> (Rudge) Baker	H	Zoo	14,762	11	Na	13	Santos and Wanderley 2012, Miyamoto 2013
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	H	Ane	18,076	1207	Na	13	Santos and Wanderley 2012, Miyamoto 2013
<i>Dyckia deltoidea</i> (L.B.Sm.) L.B.Sm.	H	Ane	18,530	20	Na	10	Ribas 2017
<i>Tillandsia stricta</i> Sol.	H	Ane	*	-	Na	10	Kremer 2011
<i>Vriesea platynema</i> Gaudich.	H	Ane	14,761	1183	Na	11	Kowalski and Tardivo 2015
Cactaceae							
<i>Hatiora salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose	H	Zoo	13,783	1522	Na	22	Soller et al. 2014
<i>Parodia carambeiensis</i> (Buining & Brederoo) Hofacker	H	Zoo	*	-	Na, CG	22	Soller et al. 2014
Campanulaceae							
<i>Lobelia camporum</i> Pohl	Ch	Aut	17,291	1460	Na	11	Vieira 1988, Godoy 2003
<i>Wahlenbergia linalooides</i> (Lam.) DC.	Ch	Aut	17,350	1600	Na, Tr	17	Godoy 2003
Caryophyllaceae							
<i>Cerastium dicotrichum</i> Fenzl ex Rohrb.	Ch	Ane	14,770	33	Na	10	Carneiro 2015a
<i>Spergularia grandis</i> (Pers.) Cambess.	Th	Ane	18,077	78	Na	10	Carneiro 2015b
Celastraceae							
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	Ph	Zoo	17,293	1677	Na	17	Carvalho-Okano 2005
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	Ph	Zoo	14,822	1736	Na	17	Carvalho-Okano 2005

Table 1. *Continued.*

Families, species	L-F	DS	Voucher	Coll.	C	Location	Reference
Cistaceae							
<i>Halimium brasiliense</i> Grosser	Th	Ane	9,252	1305	Na, ER	10/19	Reitz 1988
Clethraceae							
<i>Clethra scabra</i> Pers.	Ph	Ane	14,604	1472	Na	22	Perdiz et al. 2015
Commelinaceae							
<i>Commelina diffusa</i> Burm.f	H	Aut	19,759	1852	Na, We	10	Maia 2006, Hassemer 2017
<i>Commelina erecta</i> L.	H	Aut	18,086	27	Na	10/13	Maia 2006, Hassemer 2017
<i>Commelina villosa</i> (C.B.Clarke) C.B.Clarke ex Chodat & Hassl.	H	Aut	18,084	1429	Na, We	10	Hassemer 2017
<i>Tradescantia cerinthoides</i> Kunth	H	Aut	18,083	97	Na	10	Aona et al. 2015, Funez et al. 2016
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	H	Aut	18,088	1224	Na, Tr	22	Barreto 2005, Funez et al. 2016
Convolvulaceae							
<i>Cuscuta racemosa</i> Mart.	P	Zoo	19,381	1861	Na, We	22	Hoehne 1922
<i>Ipomoea delphinoides</i> Choisy	L	Aut	18,091	44	Na	17	Ferreira and Miotto 2009
Cucurbitaceae							
<i>Cayaponia martiana</i> (Cogn.) Cogn.	L	Zoo	19,735	1853	Na	06	Villagra and Romaniuc Neto 2011
Cyperaceae							
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C.B.Clarke	H	Aut	17,629	1373	Na, We	12	Vitta and Prata 2009
<i>Bulbostylis</i> sp	H	Aut	17,618	1470	Na	10	-
<i>Carex sellowiana</i> Schleidl.	H	Aut	14,076	77	Na	06	Silva et al. 2009
<i>Cyperus aggregatus</i> (Willd.) Endl.	G	Aut	17,622	1707	Na	10	Hefler 2010
<i>Cyperus esculentus</i> L.	G	Aut	14,077	1364	Al, We	17	Moreira and Bragança 2011
<i>Cyperus rigidus</i> C.Presl var. <i>rigens</i>	G	Aut	17,621	1462	Na	10	Hefler 2010
<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	H	Aut	17,617	1361	Na	15/19	Trevisan and Boldrini 2008
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	G	Aut	17,626	1436	Na, We	10	Gonçalves 2014
<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeckeler	H	Aut	17,627	17	Na	10	Silva et al. 2009
<i>Scleria hirtella</i> Sw.	G	Aut	17,620	88	Na	10	Silveira and Longhi-Wagner 2008
Droseraceae							
<i>Drosera brevifolia</i> Pursh	Th	Ane	14,826	1741	Na	8	Silva 2015
Ericaceae							
<i>Agarista pulchella</i> Cham. ex G.Don	Ph	Zoo	14,044	92	Na	10	Kinoshita and Romão 2012
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meisn. var. <i>brasiliensis</i>	Ph	Zoo	19,805	1862	Na	10	Romão 2011, Kinoshita and Romão 2012
Eriocaulaceae							
<i>Actinocephalus polyanthus</i> (Bong.) Sano	H	Aut	14,579	1457	Na	11	Sano and Trovó 2012
<i>Paepalanthus caldensis</i> Malme	H	Ane	14,580	1406	Na	15	Malme 1901
Erythroxylaceae							
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	Ph	Zoo	14,584	1341	Na	22	Mendonça et al. 1998
<i>Erythroxylum microphyllum</i> A.St.-Hil.	Ph	Zoo	14,581	1410	Na	15/19	Mendonça et al. 1998
<i>Erythroxylum suberosum</i> A.St.-Hil.	Ph	Zoo	14,585	1340	Na	04/13	Mendonça et al. 1998
Euphorbiaceae							
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	Ph	Zoo	14,572	1392	Na	11/14	Secco and Giulietti 2004
<i>Croton antisyphiliticus</i> Mart.	Ch	Aut	14,575	5	Na	10	Sodré et al. 2014
<i>Croton heterodoxus</i> Baill.	Ch	Aut	9,265	1720	Na	10	Caruze and Cordeiro 2007
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	Ph	Zoo	14,577	1286	Na	17	Pscheidt 2011
<i>Gymnanthes schottiana</i> Müll.Arg.	Ph	Aut	19,700	1667	Na	15	Pscheidt 2011
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Müll.Arg.	Ph	Zoo	9,258	1249	Na	17	Lucena et al. 2009
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	Ph	Zoo	*	-	Na	22	Lucena et al. 2009, Pscheidt 2011
Fabaceae							
<i>Aeschynomene falcata</i> (Poir.) DC.	Ch	Zoo	18,135	1443	Na	10	Andrade 2009
<i>Chamaecrista langsdorffii</i> (Kunth ex Vogel) Britton ex Pittier	Ch	Aut	18,563	1511	Na	10	Souza and Silva 2015
<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene var. <i>rotundifolia</i>	Th	Aut	18,561	1444	Na, Tr	10	Camargo and Miotto 2004, Dantas and Silva 2013
<i>Crotalaria hilariana</i> Benth.	Ch	Aut	18,139	1385	Na	13	Andrade 2009
<i>Desmodium affine</i> Schleidl.	Ch	Zoo	18,137	1432	Na	10	Snak et al. 2012
<i>Desmodium incanum</i> DC.	Ch	Zoo	18,146	60	Na, We	06/09/13	Andrade 2009
<i>Eriosema campestre</i> var. <i>macrophyllum</i> (Gear)	H	Aut	18,140	16	Na	10	Andrade 2009
Fortunato							
<i>Eriosema heterophyllum</i> Benth.	G	Aut	14,000	1715	Na	10	Andrade 2009, Rogalski 2009
<i>Eriosema longifolium</i> Benth.	G	Aut	18,144	1722	Na	10/13	Andrade 2009, Rogalski 2009
<i>Galactia boavista</i> (Vell.) Burkart	Ch	Aut	14,006	29	Na	13	Andrade 2009, Ceolin 2011
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	Ph	Aut	18,204	1452	Na	13	Tozzi 2016
<i>Mimosa dolens</i> var. <i>acerba</i> (Benth.) Barneby	Ch	Aut	18,206	1500	Na	10/15	Dutra 2009
<i>Mimosa invisa</i> Mart. ex Colla	Ch	Zoo	18,205	384	Na, Tr	10/13	Moreira and Bragança 2011, Tozzi 2016
<i>Mimosa lanata</i> Benth.	Ch	Aut	19,850	1854	Na	10	Dutra 2009, Tozzi 2016
<i>Mimosa micropteris</i> Benth. var. <i>micropteris</i>	Ch	Aut	18,202	1210	Na	06	Tozzi 2016
<i>Mimosa paranapiacabae</i> Barneby	Ch	Aut	18,196	39	Na	10	Tozzi 2016
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	Ph	Aut	18,564	1561	Na	17	Rodrigues et al. 2005
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	H	Zoo	14,014	1713	Na, Tr	13	Andrade 2009

Table 1. Continued.

Families, species	L-F	DS	Voucher	Coll.	C	Location	Reference
<i>Zornia reticulata</i> Sm.	H	Zoo	14,017	1442	Na, Tr	10	Andrade 2009
Gesneriaceae							
<i>Sinningia canescens</i> (Mart.) Wiehler	G	Ane	14,528	83	Na	13	Chautems 2003
Gleicheniaceae							
<i>Gleichenella pectinata</i> (Willd.) Ching	G	Ane	21,508	1869	Na	13	Prado 2005
Hypericaceae							
<i>Hypericum brasiliense</i> Choisy	Ch	Ane	14,681	1530	Na	10	Slusarski et al. 2007
<i>Hypericum ternum</i> A.St.-Hil.	Ch	Ane	17,276	1322	Na	15	Slusarski et al. 2007
Hypoxidaceae							
<i>Hypoxis decumbens</i> L.	G	Aut	19,739	1863	Na, We	10/13	Dutilh 2005, Moreira and Bragança 2011
Iridaceae							
<i>Sisyrinchium fasciculatum</i> Klatt	G	Aut	14,779	13	Na, We	10	Chukr 2003
<i>Sisyrinchium luzula</i> Klotzsch ex Klatt	G	Aut	17,582	1864	Na	10	Chukr 2003
<i>Sisyrinchium vaginatum</i> Spreng.	G	Aut	14,820	1590	Na	10	Chukr 2003
<i>Sisyrinchium wettsteinii</i> Hand.- Mazz.	G	Aut	14,532	1276	Na	10	Chukr 2003
Lamiaceae							
<i>Aegiphila verticillata</i> Vell.	G	Zoo	18,851	1865	Na	17	Harley et al. 2015
<i>Cantinoa plectranthoides</i> (Benth.) Harley & J.F.B.Pastore	Ch	Aut	14,063	91	Na	10	Silva-Luz et al. 2012
<i>Hyptis lappulacea</i> Mart. ex Benth.	Ch	Aut	14,763	1609	Na	10	Leary 2015
<i>Hyptis meridionalis</i> Harley & J.F.B. Pastore	G	Aut	14,526	1306	Na	10	Harley and Pastore 2012
<i>Peltodon longipes</i> A.St.-Hil ex Benth.	G	Aut	15,312	1603	Na	10	Moreira and Bragança 2011
<i>Salvia aliciae</i> E.P.Santos	Ch	Aut	14,791	2	Na	13	Santos 1993
Lauraceae							
<i>Cinnamomum sellowianum</i> (Nees & Mart.) Kosterm.	Ph	Zoo	14,485	1175	Na	22	Baitello 2003
<i>Nectandra grandiflora</i> Nees	Ph	Zoo	14,478	1250	Na	21	Zanon et al. 2009
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez	Ph	Zoo	19,316	1866	Na	15/21	Brotto et al. 2009
Lauraceae sp. 1	Ph	Zoo	21,258	1680	Na	15	-
Lythraceae							
<i>Cuphea calophylla</i> subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne)	Ch	Aut	14,463	1565	Na	10	Facco 2015
Lourteig							
<i>Cuphea linifolia</i> (A.St.-Hil.) Koehne	Ch	Aut	19,758	1419	Na	10	Facco 2015
Malpighiaceae							
<i>Aspicarpa pulchella</i> (Griseb.) O'Donell & Lourteig	G	Ane	14,767	15	Na	10	O'Donell and Lourteig 1943
<i>Byrsinima brachybotrya</i> Nied.	Ph	Zoo	13,485	1514	Na	13	Niedenzu 1897
<i>Byrsinima intermedia</i> A.Juss.	Ph	Zoo	16,539	1309	Na, Tr	15	Mamede 1987
Malvaceae							
<i>Bytneria hatschbachii</i> Cristóbal	Ch	Zoo	9,262	1611	Na	10	Cruz and Esteves 2009
<i>Peltaea speciosa</i> (Kunth) Standl.	G	Aut	14,775	1719	Na	21	Bovini 2015
<i>Sida santaremensis</i> Mont.	Ch	Aut	14,766	1338	Na, We	21	Bovini et al. 2001
Melastomataceae							
<i>Lavoisiera pulchella</i> Cham.	Ch	Zoo	14,445	1423	Na	15/19	Goldenberg et al. 2015
<i>Leandra aurea</i> Cogn.	Ch	Zoo	14,496	1235	Na	10	Camargo et al. 2009
<i>Leandra lacunosa</i> Cogn.	Ch	Zoo	14,499	1281	Na	10/13	Camargo et al. 2009
<i>Leandra purpurascens</i> (DC.) Cogn.	Ch	Zoo	14,498	1194	Na	14	Camargo et al. 2009
<i>Leandra xanthocoma</i> (Naudin) Cogn.	Ch	Zoo	14,800	1310	Na	15	Camargo et al. 2009
<i>Miconia cinerascens</i> Miq.	Ph	Zoo	18,273	1280	Na	04	Goldenberg 2004
<i>Miconia hyemalis</i> A.St.-Hil & Naudin	Ph	Zoo	19,792	1867	Na	17	Goldenberg 2004
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	Ph	Zoo	14,500	1191	Na	17	Goldenberg 2004
<i>Tibouchina debilis</i> Cogn.	Ch	Ane	18,274	1549	Na	11/13	Meyer et al. 2010
<i>Tibouchina dubia</i> Cogn.	Ch	Ane	18,733	1501	Na	10	Meyer et al. 2010
<i>Tibouchina frigidula</i> (DC.) Cogn.	Ch	Ane	14,808	1516	Na	10	Meyer et al. 2010
<i>Tibouchina gracilis</i> (Bonpl.) Cogn.	Ch	Ane	14,468	1416	Na	10	Meyer et al. 2010
<i>Tibouchina hatschbachii</i> Wurdack	Ph	Ane	18,281	1256	Na	15	Meyer et al. 2010
<i>Tibouchina martialis</i> (Cham.) Cogn.	Ph	Ane	14,807	1241	Na	04	Meyer et al. 2010
Meliaceae							
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	Ph	Zoo	*	-	Na	22	Pastore 2003
Monimiaceae							
<i>Mollinedia clavigera</i> Tul.	Ph	Zoo	9,263	1650	Na	14	Peixoto 2002
Moraceae							
<i>Dorstenia brasiliensis</i> Lam.	G	Zoo	14,666	63	Na	10	Boeni and Singer 2015
Myrtaceae							
<i>Calyptranthes concinna</i> DC.	Ph	Zoo	14,519	1216	Na	04	Vieira 2010, Rosa 2015
<i>Campomanesia adamantium</i> (Cambess.) O.Berg	Ph	Zoo	18,682	1365	Na	13	Lima et al. 2011
<i>Campomanesia aurea</i> O.Berg	Ph	Zoo	13,988	57	Na	10	Berg 1857
<i>Campomanesia pubescens</i> O.Berg	Ph	Zoo	14,797	1450	Na, ER (PR)	13	Lima et al. 2011
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> O.Berg	Ph	Zoo	18,278	1646	Na	04	Lima et al. 2011

Table 1. *Continued.*

Families, species	L-F	DS	Voucher	Coll.	C	Location	Reference
<i>Eucalyptus</i> sp.	Ph	Aut	13,967	1555	Al, In	17	-
<i>Eugenia handroana</i> D.Legrand	Ph	Zoo	18,678	1663	Na	14	Sobral 2011
<i>Eugenia punicifolia</i> (Kunth) DC.	Ph	Zoo	13,973	1370	Na	10	Faria Junior 2010, Sobral 2011
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	Ph	Zoo	13,971	1209	Na	10	Romagnolo and Souza 2006, Sobral 2011
<i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC.	Ph	Zoo	14,520	1287	Na	04	Rosa and Romero 2012, Bezerra 2013
<i>Myrcia hartwegiana</i> (O.Berg.) Kiersk.	Ph	Zoo	18,679	1681	Na	11	Rosa and Romero 2012
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	Ph	Zoo	18,611	1482	Na	22	Rosa and Romero 2012, Lima et al. 2015
<i>Myrcia palustris</i> DC.	Ph	Zoo	13,975	1401	Na	04	Lima et al. 2015
<i>Myrcia pulchra</i> Kiersk.	Ph	Zoo	13,969	1733	Na	22	Rosa and Romero 2012
<i>Myrcia retorta</i> Cambess.	Ph	Zoo	18,279	1403	Na	04	Rosa and Romero 2012
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	Ph	Zoo	13,985	1396	Na	04	Rosa and Romero 2012
<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O.Berg.	Ph	Zoo	14,216	1743	Na	04/22	Vieira 2010
<i>Psidium australe</i> Cambess.	Ch	Zoo	13,987	71	Na	10	Sobral et al. 2015
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	Ph	Zoo	14,506	1466	Na	13	Vieira 2010, Lima et al. 2015
<i>Psidium grandifolium</i> Mart. ex DC.	Ph	Zoo	14,515	1449	Na	13	Legrand and Klein 1977
<i>Myrtaceae</i> sp. 1	Ph	Zoo	13,977	1438	Na	10	-
<i>Myrtaceae</i> sp. 2	Ph	Zoo	13,976	1597	Na	17	-
Ochnaceae							
<i>Sauvagesia racemosa</i> A.St.-Hil	H	Aut	14,682	1456	Na	10	Salvador et al. 2010
Onagraceae							
<i>Fuchsia regia</i> (Vell.) Munz	L	Zoo	14,680	1749	Na	13	Rodrigues and Singer 2014
Orchidaceae							
<i>Acianthera sonderiana</i> (Rchb.F) Pridgeon & M.W.Chase	E	Ane	14,675	1332	Na	22	Gonçalves and Waechter 2011
<i>Epidendrum secundum</i> Jacq.	Ch	Ane	18,615	87	Na	10	Stancik et al. 2009, Pessoa and Alves 2014
<i>Gomesa recurva</i> R.Br.	E	Ane	14,677	1180	Na	11	Barros et al. 2015a
<i>Gomesa uniflora</i> (Booth ex Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	E	Ane	14,676	1481	Na	15	Barros et al. 2015b
<i>Sauvagesia nitidum</i> (Vell.) Schltr.	E	Ane	14,678	1360	Na	22	Heberle et al. 2012
Oxalidaceae							
<i>Oxalis conorrhiza</i> Jacq.	G	Aut	14,685	18	Na	21	Fiaschi and Conceição 2005
<i>Oxalis hispidula</i> Zucc.	G	Aut	14,734	6	Na	10	Cervi et al. 1988
Passifloraceae							
<i>Passiflora amethystina</i> J.C.Mikan	L	Zoo	14,827	1558	Na	10	Bernacci et al. 2003
Piperaceae							
<i>Peperomia barbara</i> C.DC.	H	Zoo	17,278	1651	Na	14	Guimarães et al. 1984
<i>Peperomia catharinae</i> Miq.	H	Zoo	13,902	1179	Na	11	Guimarães and Carvalho-Silva 2012
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A.Dietr. var. <i>glabella</i>	E	Zoo	17,280	1586	Na	14	Guimarães et al. 1984
<i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth	Ph	Zoo	14,829	1655	Na	14	Guimarães and Carvalho-Silva 2012
Plantaginaceae							
<i>Plantago guilleminiana</i> Decne.	G	Aut	14,748	22	Na	13	Souza and Souza 2002, Hassemer 2016
<i>Plantago tomentosa</i> Lam.	G	Aut	19,757	1855	Na, We	13	Souza and Souza 2002, Moreira and Bragança 2011, Hassemer 2016
Poaceae							
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	H	Ane	18,104	1418	Na, Tr	10	Dias-Melo et al. 2009, Maciel and Silva 2011, Zanin and Longhi-Wagner 2011
<i>Anthaenantia lanata</i> (Kunth) Benth.	H	Aut	18,105	1613	Na	10	Renvoize 1988
<i>Aristida pallens</i> Cav.	H	Ane	17,361	1393	Na	13	Smith and Wasshausen 1982
<i>Axonopus brasiliensis</i> (Spreng.) Kuhlm.	H	Aut	18,112	73	Na	06/10	Smith and Wasshausen 1982
<i>Axonopus marginatus</i> (Trin.) Chase	H	Aut	18,283	1860	Na	10	Renvoize 1988
<i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone	H	Aut	18,097	1725	Na	10/13	Renvoize 1988
<i>Chascolytrum calotheca</i> (Trin.) Essl. Longhi-Wagner & Souza-Chies	H	Aut	18,115	1610	Na	10	Renvoize 1988
<i>Chloris gayana</i> Kunth	H	Aut	17,363	1437	Al, In	06/13	Renvoize 1988, Moreira and Bragança 2011, Maciel et al. 2013
<i>Dichanthelium sabulorum</i> (Lam.) Gould & C.A.Clark	H	Aut	18,114	1539	Na	13	Renvoize 1988
<i>Elionurus muticus</i> (Spreng.) Kuntze	H	Aut	18,109	1616	Na, Tr	10	Renvoize 1988
<i>Eragrostis airoides</i> Nees	H	Aut	18,108	1605	Al, We	10/13	Moreira and Bragança 2011
<i>Eragrostis neesii</i> Trin.	H	Aut	18,111	1420	Na, Tr	10	Renvoize 1988
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	H	Aut	14,083	1292	Al, In	13	Moreira and Bragança 2011
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	H	Aut	18,106	1739	Al, We	13	Moreira and Bragança 2011
<i>Merostachys multiramea</i> Hack	G	Aut	*	-	Na, Tr	06/13	Smith and Wasshausen 1982
<i>Ocelochloa stolonifera</i> (Poir.) Zuloaga & Morrone	H	Aut	14,082	1505	Na	10	Sede et al. 2009
<i>Paspalum cordatum</i> Hack.	H	Aut	18,568	1526	Na	13	Renvoize 1988
<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	H	Aut	18,101	1447	Na, Tr	10	Smith and Wasshausen 1982
<i>Paspalum polyphyllum</i> Nees ex. Trin.	H	Aut	18,099	1546	Na	06/10	Dias-Melo et al. 2009, Silva 2013

Table 1. Continued.

Families, species	L-F	DS	Voucher	Coll.	C	Location	Reference
<i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi	H	Aut	17,362	1374	Na	13	Smith and Wasshausen 1982
<i>Saccharum villosum</i> Steud.	H	Ane	18,100	1594	Na	21	Smith and Wasshausen 1982
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	H	Ane	17,360	1293	Na, Tr	13	Smith and Wasshausen 1982
<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) M.B.Moss ex Stapf & C.E.Hubb.	H	Aut	17,359	1508	Na	10/13	Smith and Wasshausen 1982
<i>Trachypogon spicatus</i> (L.f.) Kuntze	H	Ane	17,364	1506	Na	06/13	Renvoize 1988
<i>Urochloa decumbens</i> (Stapf) R.D.Webster	Th	Aut	19,313	1868	Al, We	10/13	Moreira and Bragança 2011
Poaceae sp. 1	H	Aut	18,113	67	Na	10	-
Polygonaceae							
<i>Monnia cardiocarpa</i> A.St.-Hil & Moq.	H	Ane	18,120	1307	Na	10	Lüdtke et al. 2009
<i>Polygala cyparissias</i> A.St.-Hil & Moq.	Ch	Aut	14,601	1257	Na	19	Marques and Gomes 2002
Primulaceae							
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	Ph	Zoo	18,228	1734	Na	13/21	Jung-Mendaçolli et al. 2005
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	Ph	Zoo	18,233	1171	Na	04	Jung-Mendaçolli et al. 2005
Rhamnaceae							
<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw. var. <i>pubescens</i> (Reissek)	Ph	Zoo	14,561	1344	Na	11/17	Lima 2006, 2011
M.C.Johnst.							
Rosaceae							
<i>Acaena eupatoria</i> Cham. & Schltdl.	Ch	Zoo	18,619	1342	Na	10	Kiejama and Bianchini 2003
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	Ph	Zoo	14,569	1166	Na	11/15	Kiejama and Bianchini 2003
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.	Ph	Zoo	14,564	1165	Na, Tr	17	Kiejama and Bianchini 2003
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	Ph	Zoo	14,565	1267	Na		Kiejama and Bianchini 2003
Rubiaceae							
<i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K.Schum.	Th	Aut	14,885	1548	Na, We	13	Bacigalupo and Cabral 2007
<i>Borreria paranaensis</i> E.L.Cabral & Bacigalupo	Th	Aut	14,884	55	Na	10/13	Bacigalupo and Cabral 2007
<i>Borreria poaya</i> DC.	Th	Aut	14,886	1345	Na	19	Bacigalupo and Cabral 2007, Zappi et al. 2014
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	Th	Aut	17,676	12	Na, We	06	Bacigalupo and Cabral 2007, Moreira and Bragança 2011
<i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	H	Zoo	14,792	1357	Na	13/15	Costa and Mamede 2007
<i>Cordiera concolor</i> (Cham.) Kuntze	Ph	Zoo	14,880	1732	Na	15	Zappi 2007
<i>Coussarea contracta</i> (Walp.) Müll.Arg.	Ph	Zoo	19,315	1856	Na	22	Gomes 2007
<i>Galianthe elegans</i> E.L.Cabral	G	Zoo	14,906	1326	Na	22	Cabral and Salas 2015
<i>Galianthe verbenoides</i> (Cham. & Schltdl.) Griseb.	G	Zoo	14,888	1477	Na	10	Cabral 2009
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Ch	Zoo	17,394	1598	Na	17	Jung-Mendoçolli and Cabral 2007, Moreira and Bragança 2011
<i>Palicourea australis</i> C.M.Taylor	Ph	Zoo	14,892	1411	Na	04	Ferreira Junior and Vieira 2015
<i>Palicourea rigida</i> Kunth	Ch	Zoo	14,895	1422	Na	10	Taylor 2007
<i>Psychotria brachypoda</i> (Müll.Arg.) Britton	Ph	Zoo	14,894	1582	Na	14	Taylor 2007
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	Ph	Zoo	14,881	1656	Na	14	Taylor 2007
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	Ph	Zoo	19,828	1816	Na	22	Taylor 2007
<i>Rudgea parquioides</i> (Cham.) Müll.Arg.	Ph	Zoo	14,896	1397	Na	04	Zappi 2007
Rutaceae							
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	Ph	Aut	13,797	1181	Na	14	Pirani 2002
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Ph	Zoo	*	-	Na	22	Pirani 2002
Salicaceae							
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	Ph	Zoo	19,820	1661	Na	15/17	Torres and Ramos 2007
<i>Casearia lasiophylla</i> Eichler	Ph	Zoo	14,018	1225	Na	21	Torres and Ramos 2007
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Ph	Zoo	14,016	1250	Na	14/21	Torres and Ramos 2007
Sapindaceae							
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	Ph	Zoo	14,458	1471	Na	22	Ferrucci et al. 2009
Scrophulariaceae							
<i>Buddleja stachyoides</i> Cham. & Schltdl.	H	Aut	14,503	1248	Na, We	10	Moreira and Bragança 2011
Smilacaceae							
<i>Smilax brasiliensis</i> Spreng.	L	Zoo	17,711	1745	Na, Tr	22	Andreata 2003
Solanaceae							
<i>Calibrachoa heterophylla</i> (Sendtn.) Wijsman	Ch	Aut	19,770	1857	Na	10	Smith and Downs 1966
<i>Calibrachoa paranensis</i> (Dusén) Wijsman	Ch	Aut	14,489	1231	Na	13	Stehmann et al. 2015
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Ch	Zoo	17,756	1222	Na, We	17	Moreira and Bragança 2011
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	Ch	Zoo	6,482	1652	Na	14/18	Moreira and Bragança 2011
<i>Solanum hirtellum</i> (Spreng.) Hassl.	Ch	Zoo	14,488	1327	Na	15	Smith and Downs 1966
<i>Solanum inodorum</i> Vell.	L	Zoo	17,761	1488	Na	22	Smith and Downs 1966
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	Ph	Zoo	14,824	1402	Na, We	04	Smith and Downs 1966
<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	Ph	Zoo	14,486	1644	Na	04	Feliciano and Salimena 2011
<i>Solanum variabile</i> Mart.	Ph	Zoo	19,317	1858	Na	22	Smith and Downs 1966
Symplocaceae							
<i>Symplocos tenuifolia</i> Brand	Ph	Zoo	19,314	1859	Na	22	Aranha-Filho et al. 2007
Thymelaeaceae							
<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevling	Ph	Zoo	17,351	1221	Na	17	Rossi 2005
Verbenaceae							
<i>Lantana camara</i> L.	Ph	Zoo	13,602	3	Na, Tr	13/15	Moreira and Bragança 2011
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	H	Zoo	14,764	1669	Na, Tr	13/15/17	Moreira and Bragança 2011, Silva and Lima 2012

Table 1. Continued.

Families, species	L-F	DS	Voucher	Coll.	C	Location	Reference
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	H	Zoo	18,214	1730	Na	10	Silva and Salimena 2015
<i>Lippia lupulina</i> Cham.	H	Aut	13,600	1413	Na	04	Mulgura et al. 2003
<i>Verbena hirta</i> Spreng.	Ch	Zoo	18,738	36	Na	10	Thode and O'Leary 2015
<i>Verbena</i> sp.	Ch	Unk	13,591	1311	Na	15	-
Vivianaceae							
<i>Viviania albiflora</i> (Cambess.) Reiche	H	Aut	17,765	1215	Na	04	Ferreira et al. 2016
Winteraceae							
<i>Drimys brasiliensis</i> Miers	Ph	Zoo	18,223	1199	Na	13	Trinta and Santos 1997
Xyridaceae							
<i>Xyris reitzii</i> L.B.Sm. & Downs	G	Ane	18,226	1297	Na	8	Lozano 2016
Indeterminates							
Sp. 1	Unk	Unk	14,778	1738	Na	10	-
Sp. 2	Unk	Unk	17,575	1188	Na	11	-
Sp. 3	Unk	Unk	18,735	1536	Na	10	-
Sp. 4	Unk	Unk	17,213	1626	Na	10	-

Results

In Furnas Gêmeas we found 313 species belonging to 192 genera; (70 angiosperm families and 2 gymnosperm families are represented (Table 1). Just 4 angiosperm taxa were not identified to a species-level taxon. Asteraceae was the richest family, with 58 species, followed by Poaceae (26 spp.), Myrtaceae (22 spp.), Fabaceae (19 spp.), Rubiaceae (16 spp.), Melastomataceae (14 spp.), and Cyperaceae (10 spp.). These families together compound 52.6% of the total species.

The most diverse genera were *Baccharis* L. with 12 species, *Myrcia* DC. and *Solanum* L. with 7 species each, *Tibouchina* Aubl. with 6 species, and *Mimosa* L. with 5 species, accounting for 11.8% of the total species. Genera with single species represented 42.4% of the total (with 2 species = 10.8%; with 3 or 4 species = 6.7%).

Both chamaephytes and phanerophytes predominate in the study area, with 87 species each (27.6%), followed by hemicryptophytes (68 spp./21.6%), geophytes (38 spp./12.7%), therophytes (14 spp./4.4%), lianas (13 spp./4.1%), epiphytes (5 spp./1.6%), and parasites (1 sp., *Cuscuta racemosa* Mart. (von Martius 1823: 286)).

Among the dispersion syndromes, zoochoric forms totaled 116 species (36.4%) and autochoric and anemochoric forms tototaled 96 species each (31.0%). Five species remain unknown: *Verbena* sp., and the four taxa that have not been determined (1.6%).

The native flora amounted to 308 species, including transformers (22 spp.) and weeds (22 spp.) and 1 native invasive, *Gamochaeta purpurea* (L.) Cabrera (Linné 1753: 854, Cabrera 1961: 377). Among the alien species, 5 are invasive (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. (Savi 1798: 241, Tenore 1835–36: 209), *Chloris gayana* Kunth (Kunth 1830: 58), *Megathyrsus maximus* (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs (von Jacquin 1781: 2, Simon and Jacobs 2003: 572), and *Eucalyptus* L'Hér., and *Pinus* L.) and four are weeds (*Cyperus esculentus* L. (Linné 1753: 45), *Eragrostis airoides* Nees (Nees 1829: 509), *Melinis repens* (Willd.) Zizka (Willdenow 1797: 322, Zizka 1988: 55), and *Urochloa decumbens* (Stapf) R.D.Webster (Stapf 1919: 528, Webster 1988: 391)).

According to official list of threatened species in Brazil (MMA 2014), we found *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze (Bertoloni 1819: 411, Kuntze 1898: 375), *Xyris reitzii* L.B.Sm. & Downs (Smith and Downs 1960: 255), *Hippeastrum psittacinum* Herb. (Herbert 1821: 31) in the Endangered category (MMA 2014) and *Byrsonima brachybotrya* Nied (Niedenzu 1897: 206) in the Vulverable category. Five species are present in the list of threatened species of the state of Paraná (Paraná 1995), *Parodia carambeiensis* (Buining & Brederoo) Hofacker (Buining and Brederoo 1973: 1, Hofacker 1998: 11) as endemic and four classified as rare: *Campomanesia pubescens* O.Berg (Berg 1857: 443), *Halimium brasiliense* Grosser (Grosser 1903: 45), *Mandevilla coccinea* (Hook. & Arn.) Woodson (Hooker and Arnott 1834: 286, Woodson 1933: 734) and *Ruellia multifolia* (Nees) Lindau (Nees 1847: 33, Lindau 1895: 310).


A comparative analysis between FG and the reference areas shows considerable similarity between them, except for Vila Velha State Park. The Furnas Gêmeas and Piraí da Serra areas show of the greatest similarity (Fig. 4).

Amaryllidaceae

***Hippeastrum psittacinum* Herb.** (Herbert 1821: 31) (Fig. 5A): bulbous herb; leaf lamina 34.7–46.0 × 2.7–3.0 cm, lanceolate; 2-flower inflorescence; tepals with red lateral borders presenting grooves or darker red reticles, cream-yellow base green-yellow; loculicidal capsule fruit (Amaral 2007).

Areaceae

***Allagoptera campestris* (Mart.) Kuntze** (von Martius 1826: 109, Kuntze 1891: 726) (Fig. 5B): subshrub with underground stem; pinatipartite leaves, leaf lamina 65–88 cm long, emerging from the soil; leaf segments 42–46 pairs, arranged in 2 planes, lanceolate; inflorescence spike; 2 pedunculate bracts, persistent; sessile flowers, pistilate and stamineate in the same inflorescence; obovate drupe fruit, yellowish-green when mature (Caxambú et al. 2015).



Figures 4. Cluster Analysis of a 1,782 grasslands taxa matrix of FG and its surroundings. VVSP (Vila Velha State Park); PIT (Pitangui Valley); FG (Furnas Gêmeas); PS (Piraí da Serra); GSP (Guartelá State Park).

Asteraceae

Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze (Sprengel 1826: 578, Kuntze 1898: 129) (Fig. 5C): decumbent herb or ascending branches, hairy; leaf lamina $2.0\text{--}9.5 \times 0.4\text{--}1.8$ cm, linear-lanceolate, lanceolate or elliptic, opposite; solitary terminal capitulum; campanulate involucre, with involucred bracts in 2 series; yellow ligules; cypsela fruit variably, hairy, pappus usually biaristate, palease oblong to oblong-lanceolate (Santos 1984).

Baccharis dracunculifolia DC. (De Candolle 1836: 421) (Fig. 5D): subshrub and shrub, dioecious; leaf lamina $8\text{--}35 \times 2\text{--}9$ mm, linear-lanceolate to lanceolate, toothed margins and acute base; capitula discoid staminate, pedunculate, long cobs; campanulate envelope, bracts involucred 4-serial, receptacle plane, glabrous; creams corolla; cypsela abortive, setose pappus; capitula discoid pistilate, long pedunculate, spike; campanulate envelope, bracts involucral 4-serial; creams corolla, filiform; cypsela fusiform; setose pappus (Moraes 1997, Hattori and Nakajima 2008).

Chromolaena palmaris (Sch.Bip ex Baker) R.M.King & H.Rob (Schultz 1876: 294, King and Robinson 1970: 204) (Fig. 5E): subshrub with xylopodium; leaf lamina $0.8\text{--}1.5 \times 0.1\text{--}0.2$ cm, linear-lanceolate, glabrous or sparsely pubescent; capitula arranged in corymbose filiform pedicels; cylindrical-campanulate 5-serial bracts, gradually shorter to exterior, all subacute and curty peaked at the apex with 3 grooves on the back; purple corolla; fruits slightly pubescent, white pappus (Cabrera and Klein 1980).




Figure 5. Some plant species found in the Furnas Gêmeas, Campos Gerais National Park, Paraná state, Brazil. Amaryllidaceae: **A.** *Hippeastrum psittacinum*. Arecaceae: **B.** *Allagoptera campestris*. Asteraceae: **C.** *Aspilia montevidensis*. **D.** *Baccharis dracunculifolia*. **E.** *Chromolaena palmaris*. **F.** *Vernonanthura nudiflora*.

Vernonanthura nudiflora (Less) H.Rob (Lessing 1829: 258–259, Robinson 1992: 72) (Fig. 5F): herb with xylopodium; leaf lamina $6\text{--}10 \times 0.1\text{--}0.15$ cm, narrowly linear, glabrous on the ventral surface and poorly sericeous-pubescent on the dorsal surface; many corymbose capitula; campanulate involucre, tight filaria, arranged in 4 or 5 series, ovate-oblong, obtuse, lanuginous on the back; purple corolla $15\text{--}20$; cylindrical cypsela fruit, cosiate, white pappus (Cabrera and Klein 1989).

Cactaceae

Parodia carambeiensis (Buining & Brederoo) Hofacker (Buining and Brederoo 1973: 1, Hofacker 1998: 11) (Fig. 6A): rupicolous herb; green stems, unbranched; reduced leaves, modified in brown spines; areoles with 1–(2) flowers, apical; perianthed segments, yellow stamens and pistiles, pink stigmas; vinaceous elliptical berry fruit (Soller et al. 2014).

Commelinaceae

Commelina villosa (C.B.Clarke) C.B.Clarke ex Chodat & Hassl. (Chodat and Hassler 1901: 438) (Fig. 6B): erect herb; stem hairy with red spots; oblong-narrow leaves, sessile; blue corolla; capsule fruit (Hassemer 2017).

Convolvulaceae

Ipomoea delphinoides Choisy (Choisy 1858: 53) (Fig. 6C): prostrated herb; leaf lamina $4.5\text{--}9.0 \times 2\text{--}6$ cm, the entire 3 lobes, elliptical; summit, 1–5 flowers; bracts and bracteoles lanceolate; pink corolla, infundibuliform; capsule fruit (Ferreira 2009).

Fabaceae

Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene (Person 1805: 456, Greene 1899: 31) (Fig. 6D): decumbent to ascending herb; leaves with a pair of leaflets, short-




Figure 6. Some plant species found in the Furnas Gêmeas, Campos Gerais National Park, Paraná state, Brazil. Cactaceae: **A.** *Parodia carambeiensis*. Commelinaceae: **B.** *Commelina villosa*. Convolvulaceae: **C.** *Ipomoea delphinoides*. Fabaceae: **D.** *Chamaecrista langsdorffii*. **E.** *Mimosa dolens* var. *acerba*. **F.** *Mimosa lanata*.

petiolate; stipules persistent, adpressed to the stem; leaflets obovate; racemes reduced to axillary fascicles; yellow corolla; fertile 5 stamens, sometimes with 1–3 staminodes reduced; erect legume fruit, linear-oblong, plane-compressed, straight to slightly falcate (Camargo and Miotto 2004, Dantas and Silva 2013).

Desmodium incanum DC. (De Candolle 1825: 332) (Fig. 7A, B): erect to prostrate herb; pinned-trifoliate leaves; stipules connate almost to the apex when young and entirely free in adult; leaflets obovate, orbicular or rarely ovate; racemes terminal; purple or violet corolla; lomentum fruit 4–6-articulate, pubescent (Andrade et al. 2009).

Eriosema heterophyllum Benth. (Bentham 1849: 520) (Fig. 7C): prostrate to decumbent herb; unifoliolate leaves; stipules connate; leaflets ovate-lanceolate, rarely




Figure 7. Some plant species found in the Furnas Gêmeas, Campos Gerais National Park, Paraná state, Brazil. Fabaceae: **A–B.** *Desmodium incanum*. **C.** *Eriosema heterophyllum*. **D.** *Eriosema longifolium*. **E.** *Galactia boavista*. **F.** *Zornia reticulata*.

suborbicular; racemes axillary; yellow corolla; ovate legume fruit (Andrade et al. 2009, Rogalski 2009).

Eriosema longifolium Benth. (Bentham 1849: 519) (Fig. 7D): erect herb; pinned-trifoliate leaves, unifoliolate at the base of the branches; stipules connate; linear to narrow-lanceolate leaflets, with yellow punctate glands; racemes axillary, globose; yellow corolla; ovate legume fruit (Andrade et al. 2009, Rogalski 2009).

Galactia boavista (Vell.) Burk. (Velloso 1829: 309, Burkart 1971: 783) (Fig. 7E): prostrate, ascending or erect herb; unifoliolate leaves; stipules free; elliptical, leaflets oblong, obovate, rarely ovate; racemes axillary, knobby; violet or pink corolla; straight legume fruit (Andrade et al. 2009, Ceolin 2011).

Mimosa dolens var. *acerba* (Benth.) Barneby (Bentham 1841: 378, Barneby 1991: 583) (Fig. 6F): scandent shrub; bipinnate leaves, petiolate; leaflets 12–20 pairs per pinna, lancet, strigose; inflorescence capituliform solitary, globose, axillary; pink stamens; sacellum fruit (Dutra 2009).

Mimosa lanata Benth. (Bentham 1841: 379) (Fig. 6E): subshrub; bipinnate leaves, sessile; leaflets 10–18 pairs per pinna, oblong; inflorescence capituliform, grouped in racemes, terminal; lilac stamens; craspedium fruit (Dutra 2009).

Zornia reticulata Sm. (Smith 1818: 77) (Fig. 7F): erect or prostrate herb; leaves with a pair of leaflets; stipules peltate; ovate-lanceolate lower leaflets, oblong-lanceolate upper leaflets; spike inflorescence, terminal or axillary; yellow corolla; lomentum fruit 6–8-articulated, straight, tomentose (Dutra et al. 2005, Andrade et al. 2009).

Melastomataceae

Lavoisiera pulchella Cham. (von Chamisso 1834: 370) (Fig. 8A): subshrub; young branches with pedunculate-stellate trichomes; petiole absent; leaf lamina $0.9–1.5 \times 0.4–0.7$ cm, oblong-lanceolate; terminal flowers, usually 6-mere; fillets with prolonged connective; ovary adnate to hypanthium; capsule fruit (Goldenberg et al. 2015).

Leandra aurea Cogn. (Cogniaux 1886: 142) (Fig. 8C): shrub; stem, branches, leaves and hypanthium densely velutinous-hairy and sparsely furfuraceous-starred; leaf lamina $4.5–12.0 \times 2.5–6.5$ cm, elliptic to lanceolate; inflorescence thyrsus, glomerulus; fillets with connective not extended; apex ovarian hairy; berry fruit (Camargo et al. 2009).

Miconia sellowiana Naudin (Naudin 1851: 206) (Fig. 8B): shrub; stem, branches, leaves and hypanthium sparsely coated with trichomes starring, later glabrescent; leaf lamina $4.5–12.0 \times 1–3$ cm, lanceolate to oblong-lanceolate; presence of domatia; terminal panicles; calyx with deciduous laciniae in fruit; fillet with prolonged connective; glabrous ovary; berry fruit (Goldenberg 2004).

Tibouchina gracilis (Bonpl.) Cogn. (Bonpland 1823: 138, Cogniaux 1885: 386) (Fig. 8D): subshrub; petiole absent, leaf lamina $2.3–11.5 \times 0.6–3.0$ cm, elliptic or lan-




Figure 8. Some plant species found in the Furnas Gêmeas, Campos Gerais National Park, Paraná state, Brazil. Melastomataceae: **A.** *Lavoisiera pulchella*. **B.** *Miconia sellowiana*. **C.** *Leandra aurea*. **D.** *Tibouchina gracilis*. **E.** *Tibouchina hatschbachii*.

ceolate; inflorescence thyrsus, 9–27 flowers, congested; bracteoles early deciduous; calyx with persistent laciniae in fruits; glabrous fillets with prolonged connective; ovary with apex densely sericeous; capsule fruit (Meyer et al. 2010).

Tibouchina hatschbachii Wurdack (Wurdack 1963: 1) (Fig. 8E): shrubs; leaf lamina $1.6\text{--}5.5 \times 1.2\text{--}3.4$ cm, oval; solitary flowers; bracteoles persistent for a long time in bloom, located in hypanthium base; calyx with laciniae fallen in fruit; fillets with prolonged connective, moderately glandule-setose; ovary glabrous, rare sparsely setose; capsule fruit (Meyer et al. 2010).

Myrtaceae

Myrcia pulchra Kiaersk. (Kiaerskov 1893: 65) (Fig. 9A): shrubs; opposite leaves, discolors, congested at the apex of the branches; leaf lamina $3.5\text{--}10.5 \times 1.0\text{--}3.5$ cm, elliptic to lanceolate, with translucent glands; panicles multiflora, subterminal; calyx 4-mere; white corolla; hypanthium prolonged above the ovary, externally glabrous; globose berry fruit (Rosa and Romero 2012).

Psidium grandifolium Mart. ex DC. (De Candolle 1828: 234) (Fig. 9B): shrub; opposite leaves; leaf lamina $3.5\text{--}7.5 \times 2.5\text{--}4.5$ cm, obovate; calyx 5-mere, persistent; white corolla; globose or pear-shaped, berry fruit (Legrand and Klein 1977).

Orchidaceae

Epidendrum secundum Jacq. (von Jacquin 1760: 29) (Fig. 10A): herb rupicolous; cylindrical stem; short rhizome; leaves $2.5\text{--}11.5 \times 0.6\text{--}2.7$ cm, distichous, ovate to lanceolate, leathery; inflorescence corymbose; sepals and petals pink to lilac; fusiform capsule fruit (Stancik et al. 2009, Pessoa and Alves 2014).

Poaceae

Andropogon leucostachyus Kunth (Kunth 1816: 187) (Fig. 9C): perennial herb, caespitosus; ligule membranous; leaf lamina $6\text{--}52 \times 0.1\text{--}0.4$ cm, linear, glabrous; panicle with 2–6 branches; spikelets sessile, bisexual, usually aristate and spikelets pedicellate, rudimentary,



Figure 9. Some plant species found in the Furnas Gêmeas, Campos Gerais National Park, Paraná state, Brazil. Myrtaceae: **A.** *Myrcia pulchra*. **B.** *Psidium grandifolium*. Poaceae: **C.** *Andropogon leucostachyus*. **D.** *Chloris gayana*. **E.** *Paspalum polyphyllum*.

neutral, mutic or aristulate, shorter and narrower than the sessile spikelet; caryopsis fruit (Dias-Melo et al. 2009, Maciel and Silva 2011, Zanin and Longhi-Wagner 2011).

Chloris gayana Kunth (Kunth 1830: 58) (Fig. 9D): perennial herb, forming dense clumps; glabra leaf sheath; ligule surrounded by a line of trichomes hispid; leaf lamina $15\text{--}30 \times 0.2\text{--}0.4$ cm, glabrous; panicle with 9–20 branches, spikelets with (2) 3–4 anthesis; glumes 1-nervate, glabrous; caryopsis fruit (Maciel et al. 2013).

Paspalum polyphyllum Nees ex. Trin. (Trinius 1826: 114) (Fig. 9E): perennial herb, caespitosus; hairy apex in the leaf; ligule membranous; leaf lamina $2.2\text{--}9.0 \times 0.2\text{--}0.5$ cm, lanceolate, flat; inflorescence with 1–3 spikes, unilateral branches; spikelets binnary or solitary, ovate, gluma and lower palea absent; caryopsis fruit (Dias-Melo et al. 2009, Silva 2013).




Figure 10. Some plant species found in the Furnas Gêmeas, Campos Gerais National Park, Paraná state, Brazil. Orchidaceae: **A.** *Epidendrum secundum*. Rhamnaceae: **B.** *Rhamnus sphaerosperma* var. *pubescens*. Rubiaceae: **C.** *Borreria poaya*. Verbenaceae: **D.** *Lantana fucata*. **E.** *Lippia lupulina*.

Rhamnaceae

***Rhamnus sphaerosperma* Sw. var. *pubescens* (Reissek) M.C.Johnst.** (Swartz 1788: 50, Reissek 1861: 91, Johnston 1971: 51) (Fig. 10B): shrub to tree; leaves alternate; leaf lamina $5\text{--}10 \times 2.5\text{--}4.0$ cm, elliptic; stipules subulate; flowers bisexual, slightly campanulate, pubescent; globose drupe fruit, suborbicular to orbicular, black (Lima 2006, 2011).

Rubiaceae

***Borreria poaya* DC.** (De Candolle 1830: 549) (Fig. 10C): erect or decumbent herb; square branches, glabrous; stipules semilunar, connate, persistent; opposite leaves, sessile; leaf lamina $2.5\text{--}4.0 \times 1.0\text{--}1.5$ cm, lanceolate, concolorous; flowers in dense glomerulus apical and axillary, subtended by 2 extended foliaceous bracts; corolla white to lilac; obovoid capsule fruit (Zappi et al. 2014).

Verbenaceae

***Lantana fucata* Lindl.** (Lindley 1824: 798) (Fig. 10D): shrubs; branches square, erect, decumbent, rare scandent without hooklets; leaf lamina $1.5\text{--}6.5 \times 0.7\text{--}3.5$ cm, elliptic, serrate margin, discolorous, papery; inflorescence corymbose; differentiated bracts in 2 wide-oval external and oval internal, persistent in fruit; lilac corolla; ovoid drupe fruit (Silva and Lima 2012).

***Lippia lupulina* Cham.** (von Chamisso 1832: 222) (Fig. 10E): subshrub; velutinous branches; leaf lamina $4\text{--}6 \times 3\text{--}4$ cm, oval, serrated edge; inflorescence spikes-capitula, globular, terminal; developed bracts broadly ovate or orbicular-cordate, membranous, colorful, covering the corolla; corolla externally pink and internally yellow; obovate drupe fruit (Múlgura et al. 2003).

Discussion

The vegetation of Furnas Gêmeas presents low species richness when compared to better-preserved areas in the Campos Gerais region (Carmo 2006, Cervi et al. 2007, Nanuncio and Moro 2008, Moro et al. 2012). Furthermore, invasive exotic species are common. This high level of biological contamination has severe implications for biodiversity and conservation of southern Brazilian grasslands (Ziller and Galvão 2002).

We found the high richness of Asteraceae, Poaceae, Myrtaceae, Fabaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, and Cyperaceae. Several studies have pointed these families as having the larger number of taxa in the Campos Gerais region (Hatschbach and Moreira Filho 1972, Carmo 2006, Cervi et al. 2007, Nanuncio and Moro 2008, Dalazoana and Moro 2011, Moro et al. 2012, Silva et al. 2016), and therefore, we noticed that FG still retains part of its original flora.

Most of the weeds are native. Possibly favored by both wind dispersal and by frequent anthropogenic fires, they contribute to a highly resilient herbaceous community (Gómez-González et al. 2011). However, exotic species

could out-compete the native species (Ziller 2000).

It is clear that in the Campos Gerais a remarkably varied habitat having high species richness. Although our survey studied just a small part of this fragmented landscape and our data are not exhaustive, these results are show the need for additional studies. Continued impacts may lead to increased biological contamination, eliminating native species and further degrading habitats. Priority must be given to the management of grassland areas to minimize anthropogenic pressures and to promote natural regeneration that will help conserve plant and animal species. FG harbors rare and threatened species that demand urgent conservation measures. We recommend that access to FG be closed as a way to prevent the advancement of invasive species.

Acknowledgements

We thank to the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) for the scholarship to A.L.P. Andrade. We also thank the curators and staff of the HUPG, MBM, and UPCB herbaria and the Ponta Grossa State University for its logistic support.

Authors' Contributions

ALPA, RSM and MRBC collected and analyzed the data; ALPA and MRBC wrote the text; ALPA, MRBC, RSM and YSK identified specimens; MRBC and RSM reviewed the final text.

References

- Amaral AC 2007. Amaryllidaceae Jaume St.-Hil: levantamento das espécies do Distrito Federal, Brasil e estudos de multiplicação in vitro. M.Sc. dissertation, Universidade de Brasília, Brasília, 132 pp.
- Andrade ALP, Miotto STS, dos Santos EP (2009) A subfamília Faboideae (Fabaceae Lindl.) no Parque Estadual do Guartelá, Paraná, Brasil. Hoehnea 36 (4): 737–768. <https://doi.org/10.1590/s2236-89062009000400012>
- Andrade BO, Kozera C, Curcio GR, Galvão F (2011) Vascular grassland plants of Tibagi River Spring, Ponta Grossa, Brazil. Check List 7 (3): 257–262. <https://doi.org/10.15560/7.3.257>
- Andreata RHP (2003) *Smilax*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM, Melhem TS (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 323–332.
- Aona LYS, Pellegrini MOO (2015) Commelinaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB126854>. Accessed on: 2017-06-07
- APG IV (2016) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 181 (1): 1–20. <https://doi.org/10.1111/boj.12385>
- Aranha Filho JLM, Fritsch PW, Almeda F, Martins AB (2007) A revision of *Symplocos* Jacq. section *Neosymplocos* Brand (Symplocaceae). Proceedings of the California Academy of Sciences 58 (20): 407–446.
- Bacigalupo NM, Cabral EL (2007) *Borreria*.. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 276–285.
- Baitello JB (2003) Lauraceae.. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM, Melhem TS (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São

- Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 149–223.
- Baker JG (1884) Compositae: *Senecio*.. In: Martius CFP von (Ed.) Flora Brasiliensis, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum: quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Frid. Fleischer, Munich, 300–326. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.454>
- Barneby RC (1991) Sensitiae censitae: a description of the genus *Mimosa* Linnaeus (Mimosaceae) in the New World. Memoirs of the New York Botanical Garden 65: 1–835.
- Barreto RC (2005) Commelinaceae. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo: , 195–210.
- Barros F de, Vinhos F, Rodrigues VT, Barberena FFVA, Fraga CN, Pessoa EM, Forster W, Menini Neto L, Furtado SG, Nardy C, Azevedo CO, Guimarães LRS (2015a) Orchidaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB11619>. Accessed on: 2017-06-08.
- Barros F de, Vinhos F, Rodrigues VT, Barberena FFVA, Fraga CN, Pessoa EM, Forster W, Menini Neto L, Furtado SG, Nardy C, Azevedo CO, Guimarães LRS (2015b) Orchidaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB122277>. Accessed on: 2017-06-07.
- Barroso GM (1957) Flora do Itatiaia: Compositae. Rodriguésia 20 (32): 175–241.
- Bentham G (1841) Notes on Mimosae, with a short synopsis of species. Journal of Botany 4: 323–417.
- Bentham G 1849. Plantae Regnelliæ. Linnaea 22: 511–583.
- Beretta ME, Fernandes AC, Schneider AA, Ritter MR (2008) A família Asteraceae no Parque Estadual de Itapuã, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 6 (3): 189–216.
- Bernacci LC, Vitta FA, Bakker YV (2003) *Passiflora*.. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM, Melhem TS (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 248–271.
- Berg OK (1857) Myrtaceae: *Campomanesia*.. In: Martius CFP von (Ed.) Flora Brasiliensis, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum: quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Frid. Fleischer, Munich, 438–459. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.454>
- Bertoloni A (1819) Piante del brasile. Opuscoli Scientifici d'una Società di Professori della Pontifical Università di Bologna 3: 405–412.
- Bezerra KMG (2013) Estudos taxonômicos e anatônicos dos gêneros *Calyptranthes* Sw., *Marlierea* Cambess., *Myrcenia* O. Berg e *Myrcia* sect. *Aulomyrcia* (O. Berg) Griseb. (Myrtaceae) no Distrito Federal. Ph.D. thesis, Universidade de Brasília, Brasília, 182 pp.
- Boeni BO, Singer RB (2015) Synopsis of *Dorstenia* (Moraceae) in Rio Grande do Sul, southern Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências 87 (2): 925–942. <https://doi.org/10.1590/0001-3765201520140369>
- Bonpland, AJA (1823) Monographia Melastomacearum: continens plantas huius ordinis, hucusque collectas, praesertim per regnum Mexici, in provinciis Caracarum et Novae Andalusiae, in Peruvianorum, Quitenium, Novae Granatae Andibus, ad Orinocoi, fluvii Nigri, fluminis Amazonum rupas nascentes 1. Gide Fils, Paris, 158 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.16027>
- Bovini MG (2015) *Peltaea* in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB9189>. Accessed on: 2017-06-08.
- Bovini MG, Carvalho-Okano RM, and Vieira MF (2001) Malvaceae A. Juss. no Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil. Rodriguésia 52 (81): 17–47.
- Bowe LM, Coat G, de Pamphilis CW (2000) Phylogeny of seed plants based on all three genomic compartments: Extant gymnosperms are monophyletic and Gnetales' closest relatives are conifers. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 97: 4092–4097.
- Brotto ML, dos Santos EP, Baitello JB (2009) Lauraceae no Morro dos Perdidos (Floresta Atlântica), Paraná, Brasil. Rodriguésia 60 (2): 445–459.
- Brotto ML, Vieira T, dos Santos EP (2007) Flórula do Morro dos Perdidos, Serra de Araçatuba, Paraná, Brasil: Aquifoliaceae. Estudos de Biologia: Ambiente e Diversidade 29 (67): 129–135.
- Buining AFH, Brederoo AJ (1973) *Notocactus carambeiensis*. Kakteen und andere Sukkulanten 24 (1): 1–3.
- Burkart AE (1971) El género *Galactia* (Leg. Phaseoleae) en Sudamérica con especial referencia a la Argentina y países vecinos. Darwiniana 16 (3–4): 663–796.
- Cabral EL (2009) Revisión sinóptica de *Galianthe* subg. *Galianthe* (Rubiaceae: Spermacoceae), con una sección nueva. Annals of the Missouri Botanical Garden 96 (1): 27–60. <https://doi.org/10.3417/2006193>
- Cabral E, Salas R (2015) *Galianthe* in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB14005>. Accessed on: 2017-06-07.
- Cabrera AL (1961) Observaciones sobre las Inuleae-Gnaphalineae (Compositae) de América del Sur. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 9: 359–386.
- Cabrera AL, Klein RM (1980) Compostas—Tribo: Vernoniae. In: Reitz R (Ed.) Flora Ilustrada Catarinense. Herbário “Barbosa Rodrigues”, Itajaí, 227–403.
- Cabrera AL, Klein RM (1989) Compostas—Tribo: Eupatorieae. In: Reitz R (Ed.) Flora Ilustrada Catarinense. Herbário “Barbosa Rodrigues”, Itajaí, 415–470.
- Camargo EA, de Souza CMF, Caddah MK, Goldenberg R (2009) O gênero *Leandra*, seções *Carassanae*, *Chaetodon*, *Niangae*, *Oxymeris* e *Secundiflorae* (Melastomataceae) no Estado do Paraná. Rodriguésia 60 (3): 595–631.
- Camargo RA, Miotto STS (2004) O gênero *Chamaecrista* Moench (Leguminosae-Caesalpinoideae) no Rio Grande do Sul. Iheringia, Série Botânica 59 (2): 131–148.
- de Candolle AP (1825) Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive, Enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum huc usque cognitarum, juxta methodi naturalis, normas digesta, 2. Sumptibus Sociorum Treuttel et Würtz, Paris, 644 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.286>
- de Candolle AP (1828) Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive, Enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum huc usque cognitarum, juxta methodi naturalis, normas digesta, 3. Sumptibus Sociorum Treuttel et Würtz, Paris, 494 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.286>
- de Candolle AP (1830) Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive, Enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum huc usque cognitarum, juxta methodi naturalis, normas digesta, 4. Sumptibus Sociorum Treuttel et Würtz, Paris, 683 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.286>
- de Candolle AP (1836) Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive, Enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum huc usque cognitarum, juxta methodi naturalis, normas digesta, 5. Sumptibus Sociorum Treuttel et Würtz, Paris, 706 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.286>
- Carmo MRB (2006) Caracterização fitofisionômica do Parque Estadual do Guartelá, Município de Tibagi, Estado do Paraná. Ph.D. thesis, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 141 pp.
- Carmo MRB, Andrade ALP, Santos GASD, Assis MA (2012) Análise estrutural em relictos de cerrado no Parque Estadual do Guartelá, Município de Tibagi, Estado do Paraná. Ciência Florestal 22 (3): 505–517. <https://doi.org/10.1590/198050986618>
- Carmo MRB, Assis MA (2012) Caracterização florística e estrutural das florestas naturalmente fragmentadas no Parque Estadual do Guartelá, Município de Tibagi, Estado do Paraná. Acta Botanica Brasiliensis 26 (1): 133–145. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062012000100015>
- Carneiro CE (2015a) Caryophyllaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB6697>. Accessed on: 2017-06-07
- Carneiro, C.E. 2015b. Caryophyllaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br>.

- gov.br/jabot/floradobrasil/FB109631. Accessed on: 2017-06-07
- Caruzo MBR, Cordeiro I (2007) Sinopse da tribo Crotoneae Dumort. (Euphorbiaceae s.s.) no Estado de São Paulo, Brasil. Hoehnea 34 (4): 571–585. <https://doi.org/10.1590/S2236-89062007000400011>
- Carvalho-Okano RM (2005) *Maytenus*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 185–193.
- Caxambú MG, Geraldino HCL, Dettke GA, da Silva AR, dos Santos EN (2015) Palmeiras (Arecaceae) nativas no município de Campo Mourão, Paraná, Brasil. Rodriguésia 66 (1): 259–270. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201566116>
- Ceolin GB (2011) O gênero *Galactia* P. Browne (Leguminosae, Papilionoideae) no Brasil. [PhD thesis]. UFRGS, Porto Alegre, 170 pp.
- Cervi AC, Guimarães OA, Acra AL, Negrelli RRB, Sbalchiero D (1988) Catálogo das plantas ruderais da cidade de Curitiba, Brasil: Estudos Preliminares III. Acta Biológica Paranaense 17 (1): 109–139. <https://doi.org/10.5380/abpr.v17i0>
- Cervi AC, von Linsingen L, Hatschbach G, Ribas OR (2007) A vegetação do Parque Estadual de Vila Velha, Município de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Boletim do Museu Botânico Municipal de Curitiba 69: 1–52.
- Chamisso LKA von (1832) De plantis in expeditione Romanzoffiana et in herbariis Regiis observatis disserere pergitur. Linnaea 7: 105–234.
- Chamisso LKA von (1834) De plantis in expeditione speculatoria Romanzoffiana et in herbariis Regiis Berolinensibus observatis dicere pergit Adelbertus de Chamisso—Melastomaceae Americanae. Linnaea 9: 368–402.
- Chautems A (2003) *Sinningia*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM, Melhem TS (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 90–100.
- Chodat RH, Hassler E (1901) Plantae Hasslerianae soit enumeration des plantes recoltées au Paraguay. Bulletin de l'Herbier Boissier (série 2°) 1 (4): 437–438.
- Choisy JD (1858) De Convolvulaceis, dissertatio secunda, complectens recensionem generum *Batatas*, *Exogonium*, *Jacquemontia*, *Evolvulus*, nec non et paucas spectabiles species intra genera *Ipomaea*, *Aniseia* et *Breweria* excerptas. Mémoires de la société de physique et d'histoire naturelle de Genève 8 (1): 43–86.
- Chukr NS (2003) *Sisyrinchium*. In: Wanderley MGL, Shepherd GL, Giulietti AM, Melhem TS (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 138–143.
- Cogniaux CA (1885) Melastomaceae: *Tibouchina*. In: Martius CFP von (Ed.) Flora Brasiliensis, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum: quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Frid. Fleischer, Munich, 288–418. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.454>
- Cogniaux CA (1886) Melastomaceae: *Leandra*. In: Martius CFP von (Ed.) Flora Brasiliensis, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum: quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Frid. Fleischer, Munich, 66–208 <https://doi.org/10.5962/bhl.title.454>
- Corrêa IP, Pirani JR (2005) *Eryngium*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 17–26.
- Costa CB, Mamede MCH (2007) *Coccocypselum*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 292–298.
- Cota MRC (2009) Apiaceae Lindl. em Goiás e Tocantins, Brasil. M.Sc. dissertation, Universidade de Brasília, Brasília, 146pp.
- Cruz FR, Esteves GL (2009) *Bytneria*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM, Martins SE (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP, São Paulo, 260–266.
- Cruz GF (2007) Alguns aspectos do clima dos Campos Gerais.. In: Melo MS, Moro RS, Guimarães GB (Eds) Patrimônio Natural dos Campos Gerais do Paraná. Publishing Company Universidade Estadual de Ponta Grossa, 59–72.
- Dalazoana K (2010) Espacialização dos Campos Nativos na Escarpa Devoniana do Parque Nacional dos Campos Gerais, PR. M.Sc. dissertation, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 143 pp.
- Dalazoana K, MORO RS (2011) Riqueza específica em áreas de campo nativo impactadas por visitação turística e pastejo no Parque Nacional dos Campos Gerais, PR. Floresta 41 (2): 387–396. <https://doi.org/10.5380/rf.v41i2>
- Dantas MM, da Silva MJ (2013) O gênero Chamaecrista (Leguminosae, Caesalpinioideae, Cassieae) no Parque Estadual da Serra Dourada, Goiás, Brasil. Rodriguésia 64 (3): 581–595. <https://doi.org/10.1590/S2175-78602013000300010>
- Deble LP, Marchiori JNC (2007) Sinopse do gênero *Gamochaeta* Weddel (Asteraceae–Gnaphalieae) no Brasil. Balduinia 10: 21–31. <https://doi.org/10.5902/2358198014040>
- Dias-Melo R, Ferreira FM, Forzza RC (2009) Panicoideae (Poaceae) no Parque Estadual de Ibitipoca, Minas Gerais – Brasil. Boletim de Botânica do Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo 27 (2): 153–187.
- Dutilh JHA (2005) Amaryllidaceae e Hypoxidaceae.. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 244–258.
- Dutra VF (2009) Diversidade de *Mimosa* L. (Leguminosae) nos campos rupestres de Minas Gerais: taxonomia, distribuição geográfica e filogeografia. Ph.D. thesis, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 294 pp.
- Dutra VF, Messias MCTB, Garcia FCP (2005) Papilionoideae (Leguminosae) nos campos ferruginosos do Parque Estadual do Itacolomi, Minas Gerais, Brasil: florística e fenologia. Revista Brasileira de Botânica 28 (3): 493–504. <https://doi.org/10.1590/S0100-84042005000300007>
- Embrapa (2008) Mapa de solos do Estado do Paraná, 1:250.000. Embrapa, Rio de Janeiro, 74 pp.
- Esteves RL (2001) O gênero *Eupatorium* s.l. (Compositae–Eupatorieae) no Estado de São Paulo. Ph.D. thesis, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 431 pp.
- Facco MG (2015) Estudo taxonômico do gênero *Cuphea* P.Browne (Lythraceae) no Rio Grande do Sul, Brasil. M.Sc. dissertation, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 162 pp.
- Fagundes JF, Horbach RK, Essi L, Garlet TMB (2015) Levantamento florístico de Asteraceae em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 13 (3): 181–193.
- Faria Júnior JEQ (2010) O gênero *Eugenia* L. (Myrtaceae) nos estados de Goiás e Tocantins, Brasil. M.Sc. dissertation, Universidade de Brasília, Brasília, 250 pp.
- Feliciano EA, Salimena FRG (2011) Solanaceae na Serra Negra, Rio Preto, Minas Gerais. Rodriguésia 62 (1): 55–76. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201162105>
- Fernandes AC, Ritter MR (2009) A família Asteraceae no Morro Santana, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 7 (4): 395–439.
- Ferreira JPR, Hassemér G, Campestrini S, Weigend M, Trevisan R (2016) A revision of the extra-Andean Vivianiaceae. Phytotaxa 246 (1): 23–36. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.246.1.2>
- Ferreira Junior M, Vieira AOS (2015) Espécies arbóreo-arbustivas da família Rubiaceae Juss. na bacia do rio Tibagi, PR, Brasil. Hoehnea 42 (2): 289–336. <https://doi.org/10.1590/2236-8906-10/2015>
- Ferreira PPA (2009) O gênero *Ipomoea* L. (Convolvulaceae) no Rio Grande do Sul. M.Sc. dissertation, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 183 pp.
- Ferreira PPA, Miotti, STS (2009) Sinopse das espécies de *Ipomoea* L. (Convolvulaceae) ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 7 (4): 440–453.
- Ferrucci MS, Somner GV, Coelho RLG (2009) *Matayba*. In: Wanderley MGL, Shepherd GL, Melhem TS, Giulietti AM, Martins SE (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP, São Paulo, 211–214.
- Fiaschi P, Conceição AA (2005) *Oxalis*. In: Wanderley MGL, Shepherd

- GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 301–315.
- Fiaschi P, Jung-Mendaçolli SL, Cabral LP, Frodin DG (2007) *Schefflera..* In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 8–16
- Fidalgo O, Bononi VLR (Eds) 1984. Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico. (Manual 4). Instituto de Botânica, São Paulo, 62 pp.
- Funez LA, Hassemer G, Ferreira JPR (2016) Description of *Tradescantia schwirkowskiana* (Commelinaceae), a narrow endemic new species from Santa Catarina, southern Brazil, and typification of *T. crassula*. Phytotaxa 272 (1): 63–72. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.272.1.3>
- Garcia RJF (2002) *Araucaria..* In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/HUCITEC, São Paulo, 1–2.
- Godoy SAP (2003) Campanulaceae.. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM, Melhem TS (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 13–32.
- Goldenberg R (2004) O gênero *Miconia* (Melastomataceae) no Estado do Paraná, Brasil. Acta Botanica Brasílica 18 (4): 927–947. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062004000400024>
- Goldenberg R, Bacci LF, Moraes JW (2015) A tribo Microlicieae (Melastomataceae) no estado do Paraná. Rodriguésia 66 (1): 155–165. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201566108>
- Gomes M (2007) *Coussarea..* In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo: Instituto de Botânica, São Paulo, 299–306.
- Gómez-Gonzales S, Torres-Díaz C, Valencia G, Torres-Morales P, Caviaraes LA, Pausas JG (2011) Anthropogenic fires increase alien and native annual species in the Chilean coastal matorral. Diversity and Distributions 17: 58–67. <https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00728.x>
- Gonçalves CN, Waechter JL (2011) Sinopse do gênero *Acanthera Scheidw.* (Orchidaceae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 9 (2): 143–155.
- Gonçalves JS (2014) A família Cyperaceae no Município de Lavras, Minas Gerais. M.Sc. dissertation, Universidade Federal de Lavras, Lavras, 102 pp.
- Greene EL (1899) Early specific types in *Chamaecrista*. Pittonia 4 (20): 25–32.
- Grokoviski L, Cervi AC, Tardivo RC (2009) O gênero *Piptocarpha R.Br.* (Asteraceae: Vernonieae) no estado do Paraná, Brasil. Acta Botanica Brasílica 23 (2): 486–498. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062009000200020>
- Grosser WCH (1903) Cistaceae. Das Pflanzenreich: regni vegetabilis conspectus 14: 1–161.
- Guimarães EF, Ichaso CLF, Costa CG (1984) Piperáceas—*Peperomia..* In: Reitz R (Ed.) Flora Ilustrada Catarinense. Herbário “Barbosa Rodrigues”, Itajaí, 36–40.
- Guimarães EF, Carvalho-Silva, M (2012) Piperaceae.. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM, Martins SE (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 263–320.
- Harley RM, Pastore JFB (2012) A generic revision and new combinations in the Hyptidinae (Lamiaceae), based on molecular and morphological evidence. Phytotaxa 58: 1–55. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.58.1.1>
- Harley RM, França F, Santos EP, Santos JS, Pastore JF (2015) Lamiaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB8120>. Accessed on: 2017-06-08
- Hassemer G (2016) *Plantago hatschbachiana* (Plantaginaceae), a critically-endangered new species from sandstone grasslands in Brazil, and an updated identification key to *Plantago* in Brazil and Paraguay. Phytotaxa 278 (2): 141–152. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.278.2.4>
- Hassemer G (2017) Taxonomic and nomenclatural notes on Neotropical *Commelina* (Commelinaceae), and an identification key for Brazil, Guyana, Paraguay, Suriname and Uruguay. Phytotaxa 303 (2): 101–117. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.303.2.1>
- Hatschbach G, Moreira Filho H (1972) Catálogo florístico do Parque Estadual de Vila Velha (Estado do Paraná). Boletim da Universidade Federal do Paraná 28: 1–51.
- Hattori EKO, Nakajima JN (2008) A família Asteraceae na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental Galheiro, Perdizes, Minas Gerais, Brasil. Rodriguésia 59 (4): 687–749.
- Heberle W, de Freitas EM, Jasper A (2012) A família Orchidaceae no Jardim Botânico de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. Pesquisas, Botânica São Leopoldo: Instituto Anchieta de Pesquisas 63: 189–199.
- Hefler SM (2010) Novidades taxonômicas em espécies de *Cyperus* subg. *Cyperus* (Cyperaceae). Rodriguésia 61 (Suppl.): 7–14.
- Heiden G, Baumgratz JFA, Esteves RL (2012) *Baccharis* subgen. *Molina* (Asteraceae) no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia 63 (3): 649–687. <https://doi.org/10.1590/S2175-78602012000300013>
- Heiden G, Iganci JRV, Macias L (2009) *Baccharis* Sect. *Caulopterae* (Asteraceae, Astereae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Rodriguésia 60 (4): 943–983.
- Herbert W (1821) An Appendix: to the Botanical Register. James Ridgway, London, 259 pp.
- Hoehne FC (1922) Convolvuláceas. Anexos das Memórias do Instituto de Butantan, Secção de Botânica 1 (6): 32–33.
- Hofacker A (1998) Cactaceae. Cactaceae Consensus Initiatives 6: 8–19.
- Hooker WJ, Arnott GAW (1834) Contributions towards a flora of South America and the islands of the Pacific. Journal of Botany 1: 276–296.
- Jacquin NJ von (1760) Nicolai Josephi Jacquin enumeratio systematica plantarum, quas in insulis Caribaeis vicinaque Americes continente detexit novas, aut jam cognitas emendavit. Theodorum Haak, Lugduni Batavorum, 41 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.100687>
- Jacquin NJ von (1781) Icones Plantarum Rariorum 2. B. White et felium, Londini, 454 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.329>
- Johnston MC (1971) Revision of *Colubrina* (Rhamnaceae). Brittonia 23 (1): 2–53. <https://doi.org/10.2307/2805841>
- Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF, Donoghue MJ (2009) Sistemática vegetal, um enfoque filogenético. Artmed, Porto Alegre, 632 pp.
- Jung-Mendaçolli SL, Bernacci LC, Freitas MF (2005) *Rapanea*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 286–300.
- Jung-Mendoçolli, S.L. and Cabral LP (2007) *Galium..* In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 336–342.
- Kjaerskov HFC (1893) Enumeratio Myrtacearum Brasiliensium quas collegunt viri doctissimi Glaziou, Lund, Mendonça, Raben, Reinhardt, Schenck, Warming Aliique. Jul. Gjellerup, Hauniae, 247 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.4459>
- Kiejama CY, Bianchini RS (2003) Rosaceae.. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM, Melhem TS (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 285–293.
- King RM, Robinson HE (1970) Studies in the Eupatoreiae (Compositae)—XXIX. The genus *Chromolaena*. Phytologia 20 (3): 196–209. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.7118>
- King RM, Robinson HE (1971) Studies in the Eupatoreiae (Asteraceae)—LVII. The genus, *Disynaphia*. Phytologia 22 (2): 123–125. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.7118>
- Kinoshita LS6 Romão GO (2012) Ericaceae.. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM, Martins SE (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 151–172.
- Koch I, Rapini A, Simões AO, Kinoshita LS, Spina AP, Castello ACD (2015) Apocynaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim

- Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB4567>. Accessed on: 2017-06-07.
- Kowalski VK, Tardivo RC (2015) O grupo *Vriesea platynema* Gaudich. (Bromeliaceae: Tillandsioideae) no estado do Paraná, Brasil. *Rodriguésia* 66 (2): 465–475. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201566214>
- Kremer D (2011) O gênero *Tillandsia* L. (Bromeliaceae-Tillandsioideae) no Estado do Paraná, Brasil. M.Sc. dissertation, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 168 pp.
- Kunth KS (1816) Nova Genera et Species Planatarum uas in peregrinatione ad plagam aequinoctialem orbis novi colleguntur/descripserunt, partim adumbraverunt Amat, 1. Librariae Grego-Latino-Germanicae, Paris, 473 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.640>
- Kunth, K.S. (1830) Révision des Graminées. Gide Fils, Paris, 469 pp.
- Kuntze CEO (1891) *Revisio generum plantarum vascularium omnium atque cellularium multarum secundum leges nomenclature internationales cum enumeratione plantarum exoticarum in itinere mundi collectarum, mit erläuterungen*, 2. Arthur Felix, Leipzig, 633 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.124064>
- Kuntze CEO (1898) *Revisio generum plantarum vascularium omnium atque cellularium multarum secundum leges nomenclature internationales cum enumeratione plantarum exoticarum in itinere mundi collectarum, mit erläuterungen*, 3. Arthur Felix, Leipzig, 576 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.327>
- Leary NO (2015) Synopsis of subtribe Hyptidinae (Lamiaceae) in Argentina. *Phytotaxa* 233 (3): 201–235. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.233.3.1>
- Legrand CD, Klein RM (1977) Mirtáceas—*Campomanesia*, *Feijoa*, *Myrrhinium*, *Hexaclamyia*, *Siphoneugena*, *Myrcianthes*, *Neomitranches* e *Psidium*. In: Reitz R (Ed.) Flora Ilustrada Catarinense. Herbario “Barbosa Rodrigues”, Itajaí, 573–724
- Lessing CF (1829) De synatheris herbarii regii berolinensis dissertatio prima. *Linnaea* 4: 240–288.
- Lima DF, Caddah MK, Goldenberg R (2015) A família Myrtaceae na Ilha do Mel, Paranaguá, Estado do Paraná, Brasil. *Hoehnea* 42 (3): 497–519. <https://doi.org/10.1590/2236-8906-68/2014>
- Lima DF, Goldenberg R, Sobral M (2011) O gênero *Campomanesia* (Myrtaceae) no estado do Paraná, Brasil. *Rodriguésia* 62 (3): 683–693. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201162313>
- Lima RB (2006) Flora de Grão-Mogol, Minas Gerais: Rhamnaceae. Boletim de Botânica do Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo 24: 35–37.
- Lima RB (2011) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Rhamnaceae. Boletim de Botânica do Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo 29 (1): 47–55. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9052.v29i1p47-56>
- Lima LFP, Matzenbacher NI (2008) O gênero *Pterocaulon* Ell. (Asteraceae-Plucheeae) no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Série Botânica* 63 (2): 213–229.
- Lindau G (1895) Acanthaceae.. In: Engler A, Prantl K (Eds) Die Natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen, unter Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten begründet, 4. W. Engelmann, Leipzig, 274–353. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.4635>
- Lindley J (1824) *Lantana fucata*. The Botanical register consisting of coloured figures of exotic plants cultivated in British Gardens with their history and mode of treatment 10: 798.
- Linné C von (1753) Species plantarum: exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas..., 1. Laurentii Salvii, Stockholm, 560 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.669>
- Linné C von (1753) Species plantarum: exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas..., 2. Laurentii Salvii, Stockholm, 640 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.669>
- Lobão AQ, Mello-Silva R, Forzza RC (2012) *Guatteria* (Annonaceae) da Floresta Atlântica brasileira. *Rodriguésia* 63 (4): 1039–1064. <https://doi.org/10.1590/S2175-78602012000400018>
- Lorenzi H (2008) Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 4th ed. Instituto Plantarum, Nova Odessa, 640 pp.
- Lozano ED (2016) A Família Xyridaceae no Parque Nacional dos Campos Gerais.. In: Anais, 1º Seminário de Pesquisas do Parque Nacional dos Campos Gerais e da Reserva Biológica das Araucárias. ICMBio, Ponta Grossa, 37–38.
- Lucena MFA, Amorim BS, Alves M (2009) Sinopse das espécies de Euphorbiaceae s. l. do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil. *Revista Caatinga* 22 (4): 214–224.
- Lüdtke R, Souza-Chies TT, Miotti STS (2009) O gênero *Monnina* (Polygalaceae) na Região Sul do Brasil. *Acta Botanica Brasileira* 23 (1): 175–195. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062009000100021>
- Luz CLS (2011) Anacardiaceae R. BR na Flora Fanerógâmica do Estado de São Paulo. M.Sc. dissertation, Universidade de São Paulo, São Paulo, 94 pp. <https://doi.org/10.11606/D.41.2012.tde-27042012-123436>
- Maack R (1948) Notas preliminares sobre clima, solo e vegetação do Estado do Paraná. *Arquivos de Biologia e Tecnologia* 2: 102–200.
- Maciel JR, Silva MBC (2011) Distribuição e taxonomia de *Andropogon* L. (Poaceae) em Pernambuco-Brasil. Instituto Anchietano de Pesquisas, Botânica 62: 117–128.
- Maciel JR, da Silva WC, Costa-e-Silva MB (2013) O gênero *Chloris* (Poaceae) em Pernambuco, Brasil. *Rodriguésia* 64 (1): 169–177. <https://doi.org/10.1590/S2175-78602013000100014>
- Maia DC (2006) Estudo taxonômico dos gêneros *Commelina* L. e *Dichorisandra* J.C. Mikan (Commelinaceae), no Estado do Paraná, Brasil. M.Sc. dissertation, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 115 pp.
- Malme GOA (1901) Adjumenta ad floram phanerogamicam brasiliæ terrarumque adjacentium cognoscendam. *Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar* 27 (11): 1–39.
- Mamede MCH (1987) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Malpighiaceae. *Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo* 9: 157–198. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9052.v9i0p157-198>
- Marchioretto MS, Miotti STS, Siqueira JC (2010) O gênero *Pfafia* Mart. (Amaranthaceae) no Brasil. *Hoehnea* 37 (3): 461–511. <https://doi.org/10.1590/S2236-89062010000300004>
- Marchiori JNC (1996) Dendrologia das Gimnospermas. Publishing Company Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 158 pp.
- Marques MCM, Gomes K (2002) *Polygala*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerógâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/HUCITEC, São Paulo, 234–253
- Martius CFP von (1823) Reise in Brasilien: auf Befehl Sr. Majestat Maximilian Joseph I., Konigs von Baiern, in den Jahren 1817 bis 1820 gemacht und beschrieben, 1. M. Lindauer, Munich, 412 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.16406>
- Martius CFP von (1826) Historia Naturalis Palmarum: opus tripartitum, 2. T.O. Weigel, Lipsiae, 163 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.506>
- Matozinhos CN, Konno TUP (2011) Diversidade taxonômica de Apocynaceae na Serra Negra, MG, Brasil. *Hoehnea* 38 (4): 569–595. <https://doi.org/10.1590/S2236-89062011000400005>
- Melo MS, Moro RS, Guimarães GB (2007) Os Campos Gerais do Paraná.. In: Melo MS, Moro RS, Guimarães GB (Eds) Patrimônio Natural dos Campos Gerais do Paraná. Ed. UEPG, Ponta Grossa, 17–20.
- Mendonça JO, Cervi AC, Guimarães OA (1998) O Gênero *Erythroxylum* P. Browne (Erythroxylaceae) do Estado do Paraná, Brasil. *Brazilian Archives of Biology and Technology* 41 (3): 1–10.
- Meyer FS, Guimarães PJF, Goldenberg R (2010) *Tibouchina* (Melastomataceae) do estado do Paraná, Brasil. *Rodriguésia* 61 (4): 615–638.
- Miyamoto SNA (2013) O gênero *Aechmea* Ruiz & Pav. (Bromeliaceae-Bromelioideae) no Estado do Paraná, Brasil. M.Sc. dissertation, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 143 pp.
- Mioduski J, Moro RS (2011) Grupos funcionais da vegetação campes-

- tre de Alagados, Ponta Grossa, Paraná. *Iheringia, Série Botânica* 66: 241–256.
- MMA (Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas) (2007) Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira: Atualização - Portaria MMA nº9, de 23 de janeiro de 2007. MMA, Brasília, 301 pp.
- MMA (Ministério do Meio Ambiente) (2014). Portaria nº 443, de 17 de dezembro 2014. Lista Nacional Oficial das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. Diário Oficial da União, seção 1, n. 245, 18 de dezembro de 2014. 110-121. http://www.mma.gov.br/estruturas/179_arquivos/179_05122008033615.pdf. Accessed on 2017-11-17
- Mondin CA, Roque N, Bringel JBA Jr (2015) *Calea* in Lista de Espécies da Flora do Brasil. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB114867>. Accessed on 2017-06-07
- Moraes MD (1997) A família Asteraceae na Planície Litorânea de Picinguaba, Município de Ubatuba, São Paulo. M.Sc. dissertation, Universidade de Campinas, Campinas, 166 pp.
- Moreira GL, Teles AM (2014) A tribo Vernonieae Cass. (Asteraceae) na Serra Dourada, Goiás, Brasil. *Iheringia, Série Botânica* 69 (2): 357–385.
- Moreira HJC, Bragança HBN (2011) Manual de identificação de plantas infestantes: hortifruti. FMC Agricultural Products, São Paulo, 1017 pp.
- Moro RS, Nogueira MKFS, Milan E, Mioduski J, Pereira TK, Moro RF (2012) Grassland vegetation of Pitangui river valley, southern Brazil. *International Journal of Ecosystem* 2 (6): 161–170. <https://doi.org/10.5923/j.ije.20120206.03>
- Mulgura ME, Rotman AD, Atkins S (2003) Verbenaceae. In: Hunziker AT (Ed.) Flora Fanerogamica Argentina. CONICET, Buenos Aires, 2–46
- Mueller-Dombois D, Ellenberg H (1974) Aims and methods of vegetation ecology. Wiley and Sons, New York, 547 pp.
- Nanuncio VM, Moro RS (2008) O mosaico de vegetação remanescente em Pirai da Serra, Campos Gerais do Paraná: uma abordagem preliminar da fragmentação natural da paisagem. *Terr@ Plural* 2 (1): 155–168.
- Naudin CV (1851) Melastomacearum, quae in museo parisiense continentur—Monographicæ descriptions et secundum affinitates distributiones. *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* (série 3) 16: 83–246.
- Nees CGDE (1829) Gramineæ: *Eragrostis*. In: Martius CFP von (Ed.) *Flora Brasiliensis*, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum: quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Frid. Fleischer, Munich, 493–515. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.6159>
- Nees CGDE (1847) Acanthaceæ. In: Martius CFP von (Ed.) *Flora Brasiliensis*, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum: quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Frid. Fleischer, Munich, 5–164. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.454>
- Lindau G (1895) Acanthaceæ. In: Engler A, Prantl K (Eds) Die Natürlichen Pflanzenfamilien. 4. Leipzig: W. Engelmann, Leipzig, 274–353. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.4635>
- Niedenzu FJ (1897) Malpighiaceæ. In: Engler A, Prantl K (Eds) Die Natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen, unter Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten begründet, Suppl. W. Engelmann, Leipzig, 205–207.
- O'Donell CA, Lourteig A (1943) Malpighiaceæ Argentinæ. *Lilloa, Revista de Botanica* 9: 280–285.
- Oliveira AS, Marchiori JNC (2005) O gênero *Baccharis* Linnaeus, seção Oblongifoliae DC. (Asteraceæ–Astereæ), no sul do Brasil. *Balduinia* 5: 6–15. <https://doi.org/10.5902/2358198014022>
- Oliveira AS, Marchiori JNC (2006a) *Baccharis* L. (Asteraceæ–Astereæ) no sul do Brasil. 1. Secão Cylindricæ Heering, série Cylindricæ (Heering) Giuliano. *Balduinia* 7: 1–36. <https://doi.org/10.5902/2358198014030>
- Oliveira AS, Marchiori JNC (2006b) *Baccharis* L. (Asteraceæ–Astereæ) no sul do Brasil 2. Seção Cylindricæ Heering, série Axillaris Giuliano. *Balduinia* 8: 1–21. <https://doi.org/10.5902/2358198014031>
- Oliveira CC, da Silva MJ, Teles AM (2015) *Senecio* L. (Asteraceæ, Senecioneæ) no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Hoehnea* 42 (4): 703–724. <https://doi.org/10.1590/2236-8906-31/2015>
- PARANÁ. Secretaria de Estado do Meio Ambiente (1995) Lista vermelha de plantas ameaçadas de extinção no estado do Paraná. SEMA/GTZ, Curitiba, 139 pp.
- Pasini E, Katinas L, Ritter MR (2014) O gênero *Chaptalia* (Asteraceæ, Mutisieæ) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Rodriguésia* 65 (1): 141–158. <https://doi.org/10.1590/S2175-78602014000100010>
- Pastore JA (2003) *Cabralea*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM, Melhem TS (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 225–226.
- Pedralli G (2002) *Berberis*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/HUCITEC, São Paulo, 53–54.
- Peixoto AL (2002) *Mollinedia*, in: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo.: FAPESP/HUCITEC, São Paulo, 192–201.
- Perdiz RO, Giulietti AM, Oliveira RP (2015) Flora da Bahia: Clethraceæ. *Sitientibus* série Ciências Biológicas 15: 1–4. <https://doi.org/10.13102/scb342>
- Persoon CH (1805) Synopsis Plantarum: seu Enchiridium botanicum, complectens enumerationem systematicam specierum hucusque cognitarum. C.F. Cramerum, Paris, 546 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.638>
- Pessoa E, Alves M (2014) Orchidaceæ em afloramentos rochosos do estado de Pernambuco, Brasil. *Rodriguésia* 65 (3): 717–734. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201465311>
- Pijl L van der (1982) Principles of dispersal in higher plants. Springer-Verlag, New York, 161 pp.
- Philippi RA (1864) Plantarum novarum chilensium, centuriae inclusis quibusdam Medocinis et Patagonicis. *Linnaea* 33: 1–308.
- Pillar VP (2006) Estado atual e desafios para a conservação dos camposWorkshop proceedings, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 24 pp.
- Pirani JR (2002) Rutaceæ., in: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/HUCITEC, São Paulo, 281–308.
- Prado J (2005) Flora da Reserva Ducke, Amazonas, Brasil: Pteridophyta–Gleicheniaceæ. *Rodriguésia* 86: 53–55.
- Pruski JF (2005) Studies of Neotropical Compositæ—I. Novelties in *Calea*, *Clibadium*, *Conyzia*, *Llerasia*, and *Pluchea*. *Sida* 21 (4): 2023–2037.
- Pscheidt ACA (2011) Tribo Hippomaneæ A. Juss. ex Bartl. (Euphorbiaceæ s.s.) no Estado de São Paulo. M.Sc. dissertation, Instituto de Botânica da Secretaria de Meio Ambiente, São Paulo, 104 pp.
- Pyšek P, Richardson DM, Rejmánek M, Webster GL, Williamson M, Kirschner J (2004) Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. *Taxon* 5 (1): 131–143.
- Ranga NT (2012) *Moritzia*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM, Martins SE (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 132–134.
- Raunkjaer C (1934) The life forms of plants and statistical geography. Clarendon Press, Oxford, 632 pp.
- Reissek S (1861) Rhamneæ. In: Martius CFP von (Ed). *Flora Brasiliensis*, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum: quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Frid. Fleischer, Munich, 81–116. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.454>
- Reitz R (1988) Cistáceas. In: Reitz R (Ed.) Flora Ilustrada Catarinense. Herbário “Barbosa Rodrigues”, Itajaí, p. 7.
- Renvoize SA (1988) Hatschbach's Paraná Grasses. Royal Botanic Gardens, Kew, London, 78 pp.

- Ribas SP (2017) O gênero *Dyckia* Schult. & Schult.f. (Pitcairnioideae, Bromeliaceae) na região dos Campos Gerais do Paraná: aspectos taxonômicos. M.Sc. dissertation, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 87 pp.
- Ritter LMO, Ribeiro MC, Moro RS (2010) Composição florística e fitofisionomia de remanescentes disjuntos de Cerrado nos Campos Gerais, PR, Brasil—limite austral do bioma. *Biota Neotropica* 10: 379–414.
- Ritter MR, Miotto STS (2005) Taxonomia de *Mikania* Willd. (Asteraceae) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Hoehnea* 32 (3): 309–359.
- Ritter MR, Liro RM, Roque N, Nakajima JN, Souza-Buturi FO, Oliveira CT (2015) *Mikania* in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB22227>. Accessed on: 2017-06-09
- Robinson HE (1992) A new genus *Vernonanthura* (Vernonieae, Asteraceae). *Phytologia* 73: 65–76. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.16736>
- Rodrigues RS, Flores AS, Miotti STSm Baptista LRM (2005) O gênero *Senna* (Leguminosae, Caesalpinoideae) no Rio Grande do Sul, Brasil. *Acta Botanica Brasiliensis* 19 (1): 1–16. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062005000100002>
- Rodrigues DM, Singer RB (2014) As subespécies de *Fuchsia regia* (Vand. ex Vell.) Munz (Onagraceae) ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Série Botânica* 69 (2): 257–266.
- Rogalski LD (2009) Os gêneros *Eriosema* (DC.) Desv. e *Rhynchosia* Lour. (Leguminosae-Papilionoideae) nos Estados do Paraná e Santa Catarina. M.Sc. dissertation, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 119 pp.
- Romagnolo MB, de Souza MC (2006) O gênero *Eugenia* L. (Myrtaceae) na planície de alagável do Alto Rio Paraná, Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, Brasil. *Acta Botanica Brasiliensis* 20 (3): 529–548. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062006000300004>
- Romão GO (2011) Revisão taxonômica de *Gaylussacia* Kunth (Ericaceae) e estudos da filogenia do gênero. Ph.D. thesis, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 494 pp.
- Rosa PO (2015) Subtribo Myrciinae DC. e Myrceugenia O.Berg: tratamento taxonômico, flora e adequações nomenclaturais da coleção de glaziou para os estados Goiás e Tocantins. Ph.D. thesis, Universidade de Brasília, Brasília, 205 pp.
- Rosa PO, Romero R (2012) O gênero *Myrcia* (Myrtaceae) nos campos rupestres de Minas Gerais, Brasil. *Rodriguésia* 63 (3): 613–633. <https://doi.org/10.1590/S2175-78602012000300011>
- Rossi L (2005) *Daphnopsis*. In: Wanderley MGL, Shepherd GL, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/RiMa, São Paulo, 343–349.
- Sales MF (1993) Estudos taxonômicos de *Mandevilla* Lindley subgênero *Mandevilla* (Apocynaceae) no Brasil. Ph.D. thesis, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 486 pp.
- Sales MF, Kinoshita, LS (2005) *Mandevilla*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. São Paulo: FAPESP/RiMa, 60–69.
- Salvador GS, Cervi AC, Brotto ML, dos Santos EP (2010) A família Ochnaceae DC. no estado do Paraná, Brasil. *Acta Botanica Brasiliensis* 24 (2): 423–434. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062010000200013>
- Sano PT, Trovó M (2012) *Actinocephalus*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM, Martins SE (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 174–176.
- Santos EP (1993) Duas espécies novas de *Salvia* L. (Lamiaceae) do Brasil. *Bradea* 6 (30): 259–264.
- Santos JUM (1984) *Aspilia* TH. (Compositae – Geliantheae) Considerações taxonômicas do gênero no Brasil. PhD thesis, Unicamp, Campinas, 197 pp.
- Santos AL, Wanderley MGL (2012) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Bromeliaceae-Bromelioideae. Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo 30 (2): 89–107. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9052.v30i2p89-107>
- Schultz CH (1876) Compositae: *Eupatorium*. In: Martius CFP von (Ed.) *Flora Brasiliensis, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum: quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas*. Frid. Fleischer, Munich, 274–365. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.454>
- Secco RS, Giulietti AM (2004) Sinopse das espécies de *Alchornea* (Euphorbiaceae, Acalyphoideae) na Argentina. *Darwiniana* 42 (1–4): 315–331.
- Sede SM, Zuloaga FO, Morrone O (2009) Phylogenetic studies in the Paniceae (Poaceae-Panicoideae): *Ocellochloa*, a new genus from the New World. *Systematic Botany* 34 (4): 684–692. <https://doi.org/10.1600/036364409790139655>
- Senna L (2015) *Alternanthera* in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4302>. Accessed on: 2017-06-08.
- Silva AR, Andrade ALP, Velazco SE, Galvão F, Carmo MRB (2016) Florística e fitossociologia em três diferentes fitofisionomias campêstres no Sul do Brasil. *Hoehnea* 43 (3): 325–347. <https://doi.org/10.1590/2236-8906-96/2015>
- Silva AS (2013) Delimitação taxonômica e variabilidade genética de *Paspalum polyphyllum* Nees ex Trin. e *Paspalum bicilium* Mez (Poaceae, Paspaleae). M.Sc. dissertation, Universidade de Brasília, Brasília, 83 pp.
- Silva DB, Forzza RC, Alves M (2009) Cyperaceae e Juncaceae no Parque Estadual de Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil. *Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo* 27 (2): 219–234. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9052.v27i2p219-234>
- Silva MG (2011) Estudo taxonômico da subtribo *Ruelliae* Nees (Acanthaceae) no Estado do Paraná, Brasil. M.Sc. dissertation, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 76pp.
- Silva TRS (2015) Droseraceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB7421>. Accessed on: 2017-06-10.
- Silva TRS, de Lima CT (2012) Flora da Bahia: Verbenaceae 1: *Lantana*. Sítentibus série Ciências Biológicas 12 (2): 245–268. <https://doi.org/10.13102/scb100>
- Silva TRS, Salimena FRG (2015) *Lantana* in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB15167>. Accessed on: 2017-06-08.
- Silva-Luz CL, Gomes CG, Pirani JR, Harley RM (2012) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Lamiaceae. *Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo* 30 (2): 109–155. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9052.v30i2p109-155>
- Silveira GH, Longhi-Wagner HM (2008) Cyperaceae Juss. no Morro Santana – Porto Alegre e Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Série Botânica* 63 (2): 295–320.
- Simon BK, Jacobs SWL (2003) *Megathyrsus*, a new generic name for *Panicum* subgenus *Megathyrsus*. *Austrobaileya* 6 (3): 572.
- Siqueira JC (2002) Amaranthaceae. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/HUCITEC, São Paulo, 11–30.
- Slusarski SR, Cervi AC, Guimarães OA (2007) Estudo taxonômico das espécies nativas de *Hypericum* L. (Hypericaceae) no Estado do Paraná, Brasil. *Acta Botanica Brasiliensis* 21 (1): 163–184. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062007000100016>
- Smith JE (1818) *The Cyclopædia, Universal dictionary of arts, sciences, and literature*. Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown. London, 329 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.59683>
- Smith LB, Wasshausen DC (1982) Gramíneas. In: Reitz R (Ed.) Flora Ilustrada Catarinense. Herbário “Barbosa Rodrigues”, Itajaí, 523–1560.
- Smith LB, Downs RJ (1966) Solanáceas. In: Reitz R (Ed.) Flora Ilustrada Catarinense. Herbário “Barbosa Rodrigues”, Itajaí, 280–282.
- Snak C, Temponi LG, Garcia FCP (2012) Leguminosae no Parque Ecológico Paulo Gorski, Cascavel, Paraná, Brasil. *Rodriguésia* 63 (4): 999–1017. <https://doi.org/10.1590/S2175-78602012000400016>
- Soares O (1989) Furnas dos Campos Gerais, Paraná. Universidade Federal do Paraná, Scientia et Labor, Curitiba, 82 pp.
- Soares PN (2012) Taxonomia de Acilepidopsis, Chrysolaena, Echino-

- coryne, Stenocephalum e Vernonanthura (Vernonieae, Asteraceae) de Minas Gerais, Brasil. M.Sc. dissertation, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 93 pp.
- Sobral M (2011) *Eugenia* (Myrtaceae) no Paraná. Publishing Company Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 236 pp.
- Sobral M, Proença C, Souza M, Mazine F, Lucas E (2015) Myrtaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB10856>. Accessed on: 2017-06-06
- Sodré RC, da Silva MJ, de Sale MF (2014) *Croton* L. (Euphorbiaceae) no Parque Estadual da Serra Dourada, Goiás, Brasil. Rodriguésia 65 (1): 221–234. <https://doi.org/10.1590/s2175-78602014000100015>
- Soller A, Soffiatti P, Calvente A, Goldenberg R (2014) Cactaceae no estado do Paraná, Brasil. Rodriguésia 65 (1): 201–219. <https://doi.org/10.1590/s2175-78602014000100014>
- Souza AO, da Silva MJ (2015) Estudo taxonômico do gênero *Chamaecrista* Moench. (Caesalpinoideae, Leguminosae) na Floresta Nacional de Silvânia, Goiás, Brasil. Iheringia, Série Botânica 70 (1): 73–88.
- Souza JP, Souza VC (2002) *Plantago*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. FAPESP/HUCITEC, São Paulo, 225–228.
- Sprengel CPJ (1826) *Systema vegetabilium*. Editio decima sexta [...] Volumen III. Sumtibus Librariae Dieterichiana, Gottingae, 936 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.822>
- Stapf O (1919) Flora of Tropical Africa, 9. L. Reeve & Co. London, 383 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.48808>
- Stancik JF, Goldenberg R, de Barros F (2009) O gênero *Epidendrum* L. (Orchidaceae) no Estado do Paraná, Brasil. Acta Botanica Brasílica 23 (3): 864–880. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062009000300028>
- Stehmann JR, Mertz LA, Agra MF, Vignoli-Silva M, Giacomin L, Rodrigues IMC (2015) Solanaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB14617>
- Swartz O (1788) Nova genera & species plantarum, seu, Prodromus descriptionum vegetabilium, maximam partem incognitorum qua sub itinere in Indiam Occidentalem. Bibliopolis Acad. M. Swederi, Holiae, 158 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.4400>
- Taylor CM (2007) *Palicourea* e *Psychotria*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 380–412.
- Teles AM (2008) Contribuição ao estudo taxonômico da tribo Astereae no Brasil e Senecioneae (Asteraceae) no estado de Minas Gerais. Ph.D. thesis, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 256 pp.
- Tenore M (1835–1836) Saggio sulle qualità medicinali delle piante della Flora Napolitana: e sulla maniera di servirsene per surrogarle alle droghe esotiche. Tipografia Coda, Napoli, 176 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.6114>
- Thiers B (2016) Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. <http://sweetgum.nybg.org/science/ih/>. Accessed on: 2016-7-14.
- Thode V, O'Leary N (2015) *Verbena* in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB15207>. Accessed on: 2017-06-07.
- Torres RB, Ramos E (2007) *Casearia*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 207–216.
- Tozzi AMGA (2016) Leguminosae. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 264–268.
- Zappi DC, Caliò MF, Pirani JR (2014) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Rubiaceae. Boletim de Botânica do Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo 32 (1): 71–140. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9052.v32i1p71-140>
- Ziller SR (2000) A Estepe Gramíneo-Lenhosa no segundo planalto do Paraná: diagnóstico ambiental com enfoque à contaminação biológica. Ph.D. thesis, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 268 pp.
- Ziller SR, Galvão F (2002) O processo de degradação da Estepe Gramíneo-Lenhosa no Paraná por contaminação biológica de *Pinus elliottii* e *P. taeda*. UFPR, Floresta 32 (1): 41–47. <https://doi.org/10.5380/rf.v32i1>
- Zizka G (1988) Revision der Melinideae Hitchcock (Poaceae, Panicoideae). Bibliotheca Botanica 138: 1–149.
- Melhem TS, Giulietti AM, Martins SE (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 244–254.
- Trevisan R, Boldrini II (2008) O gênero *Eleocharis* R. Br. (Cyperaceae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 6 (1): 7–67.
- Triniius CB von (1826) De Graminibus Panicis. Dissertatio botanica altera. Impensis Academiae Imperialis Scientiarum, Petropoli, 289 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.15256>
- Trinta EF, Santos E (1997) Winteráceas. In: Reitz R (Ed.) Flora Ilustrada Catarinense. Herbário “Barbosa Rodrigues”, Itajaí, 5–17.
- Velloso JMC (1829) Florae fluminensis, descriptionum plantarum praefectura Fluminensi sponte mascentium liber primus ad systema sexuale concinnatus. Typographia Nationali, Flumine Januario, 353 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.745>
- Vieira AOS (1988) Estudos taxonômicos das espécies de *Lobelia* L. (Campanulaceae Juss.) que ocorrem no Brasil. Ph.D. thesis, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 327 pp.
- Vieira FCS (2010) Myrtaceae Juss. no Alto Quiriri, Garuva, Santa Catarina, Brasil. M.Sc. dissertation, Universidade de São Paulo, São Paulo, 79 pp.
- Villagra BLP, Romanuc Neto S (2011) Plantas trepadeiras do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (São Paulo, Brasil). Hoehnea 38 (3): 325–384. <https://doi.org/10.1590/S2236-89062011000300001>
- Vitta FA, Prata AP (2009) Flora de Grão – Mogol, Minas Gerais: Cyperaceae. Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo 27 (1): 43–62. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9052.v27i1p43-62>
- Webster RD (1988) The Australian Paniceae (Poaceae). Brittonia 40 (4): 391. <https://doi.org/10.2307/2807649>
- Willdenow CL (1797) Species plantarum: exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas..., 1 (1). Laurentii Salvii, Stockholm, 495 pp. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.727>
- Woodson RE (1933) Studies in the Apocynaceae. IV. The American genera of Echitoideae. Annals of the Missouri Botanical Garden 20: 605–790.
- Wurdack JJ (1963) Melastomataceas novas do estado do Paraná. Papéis Avulsos Herbário Hatschbach 4: 1–8.
- Zanin A, Longhi-Wagner HM (2011) Revisão de *Andropogon* (Poaceae – Andropogoneae) para o Brasil. Rodriguésia 62 (1): 171–202. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201162112>
- Zanon MMF, Goldenberg R, de Moraes PLR (2009) O gênero *Nectandra* Rol. ex Rottb. (Lauraceae) no Estado do Paraná, Brasil. Acta Botanica Brasílica 23 (1): 22–35. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062009000100004>
- Zappi D (2007) *Alibertia*. In: Wanderley MGL, Shepherd GJ, Melhem TS, Giulietti AM (Eds) Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, 264–268.
- Zappi DC, Caliò MF, Pirani JR (2014) Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Rubiaceae. Boletim de Botânica do Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo 32 (1): 71–140. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9052.v32i1p71-140>
- Ziller SR (2000) A Estepe Gramíneo-Lenhosa no segundo planalto do Paraná: diagnóstico ambiental com enfoque à contaminação biológica. Ph.D. thesis, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 268 pp.
- Ziller SR, Galvão F (2002) O processo de degradação da Estepe Gramíneo-Lenhosa no Paraná por contaminação biológica de *Pinus elliottii* e *P. taeda*. UFPR, Floresta 32 (1): 41–47. <https://doi.org/10.5380/rf.v32i1>
- Zizka G (1988) Revision der Melinideae Hitchcock (Poaceae, Panicoideae). Bibliotheca Botanica 138: 1–149.