

# Lycopée du Saint-Laurent

*Lycopus americanus* var. *laurentianus*

Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec  
Endémique à l'est de l'Amérique du Nord

## Identification

(mi-août à fin septembre)

**Herbacée vivace des milieux humides, glabre et stolonifère.**



Tige légèrement ailée aux angles et non tubéreuse à la base, de 10 à 60 cm de haut.



Feuilles glabres, pétiolées, dentées, non lobées avec les basilaires plus ou moins incisées.



Petites fleurs verticillées, en glomérules axillaires denses. Calice glabre ou légèrement cilié, à 5 lobes subégaux.

Corolle à 4 lobes, égale ou légèrement plus longue que le calice.

Floraison estivale.



Nucules bordées d'une aile mince et étroite, entière et dont le sommet est lisse et sans bosse.

Fructification d'août à octobre.




© Frédéric Coursol

Ressemble à  
*Lycopus uniflorus* et à *Lycopus americanus*  
var. *americanus*.

# Habitat

Domaine bioclimatique de l'érablière à tilleul.

Grèves rocheuses, boueuses, submergées par les marées d'eau douce de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, et aussi sur les rivages de grands lacs et rivières.



## Enjeux de conservation

La principale menace pour cette plante est le passage de véhicules motorisés dans son habitat à marée basse, qui provoque une baisse de recrutement lorsqu'un grand nombre d'individus sont écrasés. Le remblayage des rives et la construction de marinas constituent également des menaces préoccupantes.

Moins de 50 occurrences récentes de cette espèce ont été inventoriées. Il existe de bonnes possibilités d'en découvrir de nouvelles.

En cas d'observation, svp, compléter le formulaire d'occurrence du CDPNQ | [www.cdpnq.gouv.qc.ca](http://www.cdpnq.gouv.qc.ca)