



ARBORIZAÇÃO URBANA



**ESPÉCIES DE MÉDIO PORTE
CONDUZIDAS PARA A
ARBORIZAÇÃO EM VIAS
PÚBLICAS OU CANTEIROS
CENTRAIS SEM REDE
ELÉTRICA...**





Nome popular: Araçá – Amarelo

- ❖ **Espécie:** *Psidium cattleianum*
- ❖ **Família:** Myrtaceae
- ❖ **Ocorrência no RS:** Nativa
- ❖ **Distribuição geográfica:** No Rio Grande do Sul ocorre na floresta atlântica e ocasionalmente na floresta da encosta meridional da Serra Geral (Sobral et al. 2006).
- ❖ **3-6m de altura**
- ❖ **Flor creme**
- ❖ **Semi C**
- ❖ **Pivotante**
- ❖ **Copa Globosa**
 - **Fruto Baga**
 - **Abr./Mai**



Nome popular: Araticum

- **Espécie:** *Annona sylvatica*
- **Família:** Annonaceae
- ❖ **Ocorrência no RS:** Nativa
- ❖ **5-12m de altura**
- ❖ **Flor amarela-esverdeada**
- ❖ **Pivotante**
- ❖ **Perene**
- ❖ **Copa globosa**
- ❖ **Fruto baga**



Nome popular: Camboim

- ❖ **Espécie:** *Myrciaria tenella*
- ❖ **Família:** Myrtaceae
- ❖ **Ocorrência no RS:** Nativa
- ❖ **Distribuição geográfica:** No Rio Grande do Sul é comum na floresta do Alto Uruguai, na floresta da encosta meridional da Serra Geral e na floresta da encosta da Serra do Sudeste (Sobral et al. 2006)
- ❖ **2-5 m de altura**
- ❖ **Flor branca**
- ❖ **Semi- C**
- ❖ **Copa Globosa**
- ❖ **Pivotante**
- ❖ **Fruto baga**



Nome popular: Carobinha

- ❖ **Espécie:** *Jacaranda puberula*
- ❖ **Família:** Bignoniaceae
- ❖ **Ocorrência no RS:** Nativa
- ❖ **4-7m de altura**
- ❖ **Flor Lilás**
- ❖ **Pivotante**
- ❖ **Caducifólia**
- ❖ **Copa Flabeliforme a Globosa**
- ❖ **Fruto cápsula**



Nome popular: Cássia-macranthera

- ❖ Nome Científico: *Senna macranthera*
- ❖ Família: Fabaceae
- ❖ Ocorrência no RS: Nativa
- ❖ 6-9m de altura
- ❖ Flor amarela
- ❖ Caducifólia
- ❖ Copa Globosa
- ❖ Raiz Pivotal
- ❖ Fruto vagem



Nome popular: Cerejeira

- ❖ Espécie: *Eugenia involucrata*
- ❖ Família: Myrtaceae
- ❖ Ocorrência no RS: Nativa
- ❖ Distribuição geográfica:
- ❖ No Rio Grande do Sul é comum nas florestas do Alto Uruguai, da encosta meridional da Serra Geral e da encosta da Serra do Sudeste (Sobral et al. 2006).
- ❖ 3-6m de altura
- ❖ Flor Branca
- ❖ Pivotante
- ❖ Perene
- ❖ Copa globosa
- ❖ Fruto drupa



Sérgio Bordignon



gatini ©



Sérgio Bordignon

Nome popular: Chal-chal

- ❖ **Espécie:** *Allophylus edulis*
- ❖ **Família:** Sapindaceae
- ❖ **Ocorrência no RS:** Nativa
- ❖ **Distribuição geográfica:** No Rio Grande do Sul ocorre em todas as formações florestais (Sobral et al. 2006).
- ❖ **6-10m de altura**
- ❖ **Flor branca**
- ❖ **Pivotante**
- ❖ **Semi C**
- ❖ **Copa Globosa**
- ❖ **Fruto bagas**



Nome popular: Cutia amarela

- ❖ Espécie: *Esenbeckia grandiflora*
- ❖ Família: Rutaceae
- ❖ Ocorrência no RS: Nativa
- ❖ 4-8 m de altura
- ❖ Flor Branca
- ❖ Perene
- ❖ Raiz pivotante
- ❖ Copa elíptica horizontal
- ❖ Fruto esquizocarpo denticulado



Nome popular: Ingá Feijão

- ❖ **Espécie:** *Inga marginata*
- ❖ **Família:** Fabaceae
- Ocorrência no RS:** Nativa
- ❖ **-15m de altura**
- ❖ **Flor Branca**
- ❖ **Fasciculada**
- ❖ **Semi - Caducifólias**
- ❖ **Copa globosa**
- ❖ **Fruto Vagem**



Nome popular: Ipê amarelo

- ❖ Espécie: *Handroanthus chrysotrichus*
- ❖ Família: Bignoniaceae
- ❖ Ocorrência no RS: Nativa
- ❖ 7-12m de altura
- ❖ Flor amarela
- ❖ Pivotante
- ❖ Caducifólias
- ❖ Copa Elíptica
- ❖ Fruto Sílqua




Nome popular: Ipê branco

- ❖ Espécie: *Handroanthus roseo albus*
- ❖ Família: Bignoniaceae
- ❖ Ocorrência no RS: Nativa
- ❖ 6-10m de altura
- ❖ Flor branca
- ❖ Pivotante
- ❖ Caducifólias
- ❖ Copa elíptica
- ❖ Fruto vagem



Nome popular: Ipê da Várzea

- ❖ Espécie: *Handroanthus umbellatus*
- ❖ Família: Bignoniaceae
- ❖ Ocorrência no RS: Nativa
- ❖ -12m de altura
- ❖ Flor Amarela
- ❖ Pivotante
- ❖ Caducifólias
- ❖ Copa Disforme
- ❖ Fruto Síliqua



Nome popular: Manacá da Serra

- ❖ Espécie: *Tibouchina mutabilis*
- ❖ Família: Melastomataceae
- ❖ Ocorrência no RS: Nativa
- ❖ 7-12m de altura
- ❖ Flor branca, rosa e lilás
- ❖ Pivotante
- ❖ Perene
- ❖ Copa Globosa



Nome popular: Quaresmeira

- ❖ **Espécie:** *Tibouchina granulosa*
- ❖ **Família:** Melastomataceae
- ❖ **Ocorrência no RS:** Nativa
- ❖ **8-10m de altura**
- ❖ **Flor rosa - roxa**
- ❖ **Pivotante**
- ❖ **Perene**
- ❖ **Copa Umbeliforme**

A Quaresmeira, apresenta bonita floração roxa que ocorre duas vezes por ano, possui fruto pequeno.


É uma das principais árvores utilizadas na arborização urbana em todo o Brasil.



Nome popular: Uvaia



- ❖ Espécie: *Eugenia pyriformis* Cambess
- ❖ Família: Myrtaceae.
- ❖ Ocorrência no RS: Nativa
- ❖ -15m de altura
- ❖ Flor branca
- ❖ Pivotante
- ❖ Perene
- ❖ Copa globosa
- ❖ Fruto drupa



Gerson L. Lopes

Nome popular: Ingá banana

- ❖ **Espécie:** *Inga vera*
- ❖ **Família:** Fabaceae
- ❖ **Ocorrência no RS:** Nativa
- ❖ **-10 m de altura**
- ❖ **Flor Branca**
- ❖ **Semi C**
- ❖ **Pivotante**
- ❖ **Copa globosa**





Nome popular: Acácia mimosa

- ❖ Nome Científico: *Acacia podalyriifolia*
- ❖ Família: Fabaceae
- ❖ Ocorrência no RS: Exótica
- ❖ Até 7m de altura
- ❖ Flor amarela
- ❖ Pivotante
- ❖ PERENE
- ❖ Copa Globosa



Descrição

Árvore de crescimento rápido e porte pequeno. Suas flores amarelas se destacam de forma extraordinária da folhagem prateada. Aceita grande variedade de solos, mas exige uma boa drenagem. Não aceita bem as podas.



Uma boa drenagem. Não aceita bem as podas.

Nome popular: Acer - roxo

- ❖ **Espécie:** *Acer palmatum atropurpure*
- ❖ **Família:** Aceraceae
- ❖ **Ocorrência no RS:** Exótica
- ❖ **5-7m de altura**
- ❖ **Flor vermelha**
- ❖ **Pivotante**
- ❖ **Caducifólia**
- ❖ **Copa Globosa**



Nome popular: Brinco da Índia

- Espécie: *Cojoba arborea*
- Família: Fabaceae
- Ocorrência no RS: exótica
- -12m de altura
- ❖ Flor branca
- ❖ Pivotante
- ❖ Folhas perenes
- ❖ Copa globosa



Nome popular: Chuva de ouro

- ❖ Espécie: *Senna multijuga*
- ❖ Família: Fabaceae
- ❖ Ocorrência no RS: exótica estabelecida
- ❖ 6-10m de altura
- ❖ Flor amarela
- ❖ Pivotante
- ❖ Caducifólia
- ❖ Copa Globosa
- ❖ Fruto legume



Nome popular: Magnolia

- ❖ Espécie: *Michelia champaca*
- ❖ Família: Magnoliaceae
- ❖ Ocorrência no RS: Exótica
- ❖ 7-12m de altura
- ❖ Flor amarela
- ❖ Pivotalante
- ❖ Semi-C
- ❖ Copa elíptica




Gerson L. Lopes

Gerson L. Lopes

Nome popular: Nespereira

- ❖ Espécie: *Eriobotrya japonica*
- ❖ Família: Rosaceae
- ❖ Ocorrência no RS: exótica estabelecida
- ❖ 10m de altura
- ❖ Flor branca
- ❖ Pivotante
- ❖ Folhas perenes
- ❖ Copa flabeliforme



Nome popular: Pata de Vaca

- ❖ Espécie: *Bauhinia Purpurea*
- ❖ Família: Fabaceae
- ❖ Ocorrência no RS: Exótica
- ❖ 5-6m de altura
- ❖ Flor rosa
- ❖ Pivotante
- ❖ Perene
- ❖ Copa Globosa



Nome popular: Pata de Vaca

- ❖ **Espécie:** *Bauhinia blakeana*
- ❖ **Família:** Malvaceae
- ❖ **Ocorrência no RS:** Exótica
- ❖ **6-8m de altura**
- ❖ **Flor rosa**
- ❖ **Pivotante**
- ❖ **Perene**
- ❖ **Copa Globosa**



Nome popular: Liquidambar

- ❖ **Espécie: Liquidambar styraciflua**
- ❖ **Família: Hamamelidaceae**
- ❖ **Ocorrência no RS: Exótica**
- ❖ **-20m de altura**
- ❖ **Flor amarela**
- ❖ **Pivotante com possíveis adventíceas**
- ❖ **Caducifólia**
- ❖ **Copa elíptica vertical**
- ❖ **Usado em:**
 - grandes parques, praças e jardins;
 - arborização de auto estradas ou avenidas que oferecem bastante espaço;
 - onde se precisa uma boa sombra no verão e sol no inverno.
 - Na primavera surgem as inflorescências, esféricas, amarelas e de pouca importância ornamental.
 - Elas são seguidas pelos frutos, também globosos, recobertos por espinhos e lenhosos quando maduros.



Liquidambar com sementes

