

# Cortaderia araucana

Stapf

Cola de zorro, cortadera

**Floración:** 

**Fructificación:** 

**Familia:** Poáceas (Gramineae).

**Origen geográfico:** Endémica de Chile y Argentina.

**Distribución en Chile:** Regiones de O'Higgins a la de Aysén.

**Descripción:** Gramínea de porte arbustivo. Hojas de 0,8 x 1 cm, verde azuladas o amarillentas y algo violáceas hacia la base, vellosas en los márgenes y cortantes. Inflorescencia en panoja densa, de color marfil-violáceo, la femenina más densa y sedosa que la masculina, ambas más laxas a la madurez. Las espiguillas femeninas y masculinas tienen entre 15 y 20 cm de largo, antecios pilosos, más pilosos los femeninos. Aristas largas, robustas y rectas; estaminodios del mismo tamaño o incluidos entre las glumelas. Antecio de menos de 2,3 cm de largo. Florece en primavera y verano. Fruto una cariopse que madura a fines del verano.

**Hábitat:** Vive en sitios húmedos o a orillas de cursos de agua, a pleno sol, desde el nivel del mar hasta los matorrales subandinos. Resiste nieve ocasional y hasta un mes de sequía, pero prefiere climas lluviosos.

**Propagación:** Se propaga por semillas sembradas en otoño en almácigo estratificado o normal en primavera. Se multiplica vegetativamente a fines de otoño por separación de macolla.

**Utilización:** Se planta en jardines a pleno sol cerca de estanques, cursos de agua o en medio de prados. Protege las orillas de los ríos y de los esteros contra la erosión de las aguas. Se usa también como seto vivo. Dondequiera que se plante, sus espigas florales, mecidas o desgranadas por el viento, producirán hermosos efectos de brillo, luz y movimiento.



