

Espeletia (Klejovka)

čeleď: Asteraceae

Roste v Kolumbii, Venezuele a Ekvádoru v podobě trvalky, keře nebo i stromu. Listy jsou sukulentně ztlustlé, zpravidla střídavé a seskupené na koncích větví. Kvete obvykle žlutými květy v úbořech, které mohou být seskupené v latách nebo hroznech.

Vyhovuje ji dobře propustná půda s dostatkem světla a čerstvého vzduchu.

Množí se dělením.

Espeletia algodonosa

Espeletia alternifolia

Espeletia annemariana

Espeletia arbelaezii

Espeletia argentea

synonyma: *E. argentea* f. *phaneractis*, *E. argentea* subsp. *phaneractis*, *E. nivea*, *E. phaneractis*, *E. phaneractis* subsp. *boyacensis*

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Kmínky buď zcela chybí anebo jsou pouze krátké. Listy jsou seskupené do terminálních svazků, jsou čárkovité, stříbřitě ochlupené a dlouhé do 45cm. Kvete ve terminálních úbořech o průměru do 3cm seskupených do chocholíků, okvětní lístky jsou žluté a terčové hnědé.

Espeletia aristeguietana

Espeletia aurantia

Espeletia azucarina

Espeletia barclayana

Espeletia batata

Espeletia boyacensis

Espeletia brachyaxiantha

Espeletia brassicoidea

synonyma: *E. brassicoidea* f. *constricta*, *E. brassicoidea* f. *minorifolia*, *E. brassicoidea* subsp. *angusta*, *E. brassicoidea* subsp. *brassicoidea*

Espeletia cabrerensis

Espeletia canescens

Espeletia cayetana

synonyma: *E. grandiflora* var. *cayetana*

Espeletia centroandina

Espeletia chocontana

Espeletia cleefii

Espeletia cochensis

Espeletia congestiflora

Espeletia conglomerata

synonyma: *E. conglomerata* var. *macroclada*, *E. conglomerata* var. *pedunculata*

Espeletia cuniculorum

Espeletia curialensis

Espeletia discoidea

Espeletia dugandii

Espeletia estanislana

Espeletia frontinoensis

Espeletia garcibarrigae

Espeletia grandiflora

synonyma: E. grandiflora f. longiligulata, E. grandiflora f. multiflora, E. grandiflora f. reducta, E. grandiflora var. subnivalis

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou eliptické, šedě až rezavě ochlupené, dlouhé do 50cm a po odumření zůstávají na rostlině. Kvete v úborech o průměru do 4cm seskupených do husté terminální laty, okvětní lístky jsou žluté a terčové hnědé.

Espeletia hartwegiana

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v páramu na hranicích Kolumbie a Ekvádoru. Listy vytvářejí růžici, usycháním vytváří nepravý stonek chráněný a pokrytý odumřelými listy, ty jsou dužnaté, kopinaté, ochlupené a dlouhé 40 - 60cm. Květenstvím je žlutý úbor a terč je hnědý. Plodem je malý hnědočerná nažka.

Není mrazuvzdorná, ale teplota by ani v létě neměla ani přesahovat 18 - 20°C.

Espeletia hartwigiana

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru z nadmořské výšky 4000m. Mladá rostlina vytváří pouze listovou růžici. V dospělosti vytváří kmen pokrytý vrstvou starých odumřelých listů chránící rostlinu před nízkými teplotami. Může tak dorůst až do výšky 1,5m. Listy mají kopinatý tvar, jsou dlouhé 40 - 60cm.

Nemá rád příliš vysoké letní teploty. Doporučuje se udržovat teplotu v mezích 18 - 20°C.

Rozmnožuje se semeny, avšak mají velmi špatnou klíčivost. Zalévejte opatrně, nejlépe z podmisky.

Espeletia idroboi

Espeletia incana

Espeletia jajoensis

synonyma: Espeletiopsis jajoensis

Espeletia jaramilloi

Espeletia killipii

synonyma: *E. killipii* var. *chisacana*

Espeletia leporina

Espeletia lopezii

synonyma: *E. lopezii* f. *alticola*

Espeletia marnixiana

Espeletia marthae

Espeletia miradorensis

synonyma: *E. grandiflora* var. *miradorensis*

Espeletia moritziana

Espeletia mucubaji

Espeletia murilloi

synonyma: *E. murilloi* subsp. *subcoriacea*, *E. murilloi* var. *rusiana*, *E. murilloi* var. *subcoriacea*

Espeletia nana

Espeletia nemekenei

Espeletia occidentalis

synonyma: *E. occidentalis* var. *antioquensis*

Espeletia oswaldiana

Espeletia paipana

Espeletia perijaensis

Espeletia pescana

synonyma: E. brachyaxiantha subsp. pescana

Espeletia picnophyla

Espeletia praefrontina

Espeletia pycnophylla

oblasti: Andy

Espeletia roberti

Espeletia rositae

synonyma: E. rositae var. macrocephala

Espeletia schultesiana

Espeletia schultzii (Klejovka Schulzova)

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, S Andy, Venezuela

Roste v Andách Kolumbie, Ekvádoru a Venezuely zpravidla bez kmínku. Povrch je ochlupený. Listy jsou úzce kopinaté a ochlupené. Na asi 1m kmíncích vytváří listové růžice, které se na noc zavírají. Kvete žlutými květy v ochlupených úborech.

Roste v oblasti párama.

Espeletia semiglobulata

synonyma: E. rufescens

Espeletia smithiana

Espeletia standleyana

synonyma: E. standleyana var. ampla, E. standleyana var. laxior

Espeletia steyermarkii

Espeletia subneriifolia

Espeletia summapacis

Espeletia tachirensis

Espeletia tapirophila

Espeletia tenorae

Espeletia tillettii

Espeletia tunjana

Espeletia ulotricha

Espeletia uribei

Espeletia weddellii

Espeletia x almorzana

synonyma: E. x almorzana f. latifolia

Espeletia x guascensis

Espeletia x pachoana

synonyma: E. x pachoana f. brevifolia

Espeletia x verdeana

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1894>

<https://www.rostliny.net/>