

Paederia (Pederie)

čeleď: Rubiaceae

Jedná se o opadavé popínavé keře. Palisty jsou široké, uťaté a srostlé s řapíkem. Listy jsou vstřícné (i v 3četném přeslenu), celokrajné, blanité, mají dlouhé řapíky a při rozemnutí páchnou. Květenstvím je koncová 4 - 6tičetná terminální lata složená z postranních vrcholíků a ty z vlastních drobných květů s nálevkovitou až trubkovitou korunou s ochlupeným jícem a krátkými laloky. Plody jsou kulovité až vejčité a zploštělé.

Množí se semeny a letními řízký.

Paederia argentea

synonyma: Lecontea argentea, Lecontea argentifolia, P. argentifolia, Siphomeris argentifolia

Paederia axilliflora

Paederia bojeriana

synonyma: Lecontea bojeriana, P. lingu, Siphomeris lingu

Paederia brasiliensis

synonyma: Disodea foetida, Hondbesseion gardneri, Hondbesseion olens, Hondbesseion olens var. angustifolium, Lygodisodea brasiliensis, Lygodisodea foetida, Manettia diffusa, P. diffusa, P. gardneri, P. olens, Poederiopsis diffusa

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Peru

Pochází z Jižní Ameriky. Roste v podobě dřevité popínavky. Listy jsou eliptické až vejčité, špičaté, dlouhé 5,5 - 10cm, báze špičatá až srdčitá a řapíky jsou dlouhé a tenké. Květy jsou tmavě růžovofialové až červené, koruna je dlouhá 6 - 8mm a kališní laloky jsou vejčité a zašpičatělé. Plody jsou eliptické, dlouhé 1 - 1,3cm.

Paederia calycina

synonyma: Hondbesseion calycinum

Paederia cavaleriei

Paederia changquan

Paederia ciliata

synonyma: Lygodisodea ciliata, Lygodisodea mexicana, P. pringlei, Rondeletia volubilis

Paederia cruddasiana

synonyma: *P. aestivalis*, *P. autumnalis*, *P. cruddasiana* subsp. *microcarpa*, *P. foetida* var. *microcarpa*

oblasti: Bhútán, Florida, SV Indie

Pochází z Asie. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *cruddasiana* - Bhútán, Indie; kmínek dlouhý do 10m, v mládí ochlupený; listy vejčité, špičaté, dlouhé 11 - 19cm, široké 3,7 - 8,5cm, báze uťatá, spodní strana v paždí žilek ochlupená a řapíky dlouhé 1,5 - 5,5cm; květenství dlouhé 1 - 10cm, vlastní květy prakticky přisedlé, kališní cípy 3úhlé, dlouhé 1,2mm, koruna na vnější straně načervenalá až narůžovofialovělá, trubka dlouhá 0,9 - 1,6cm, laloky vejčité, okraj zvlněný, dlouhý 1,5mm; plody vejčité, zploštělé, dlouhé 0,9 - 1,1cm a široké 6 - 9mm

Paederia emeiensis

Paederia farinosa

synonyma: *Lecontea farinosa*, *P. grevei*

Paederia foetida

synonyma: *Apocynum foetidum*, *Crawfurdia paniculata*, *Gentiana scandens*, *Hondbesseion foetidum*, *Hondbesseion tomentosum*, *P. amboinensis*, *P. barbulata*, *P. chinensis*, *P. chinensis* f. *microphylla*, *P. chinensis* f. *tenuissima*, *P. chinensis* var. *angustifolia*, *P. chinensis* var. *maritima*, *P. chinensis* var. *megaphylla*, *P. chinensis* var. *velutina*, *P. corymbosa*, *P. dunniana*, *P. esquirolii*, *P. foetida* f. *microphylla*, *P. foetida* var. *sessiliflora*, *P. laxiflora*, *P. longituba*, *P. magnifolia*, *P. mairei*, *P. ovata*, *P. prainii*, *P. scaberula*, *P. scandens*, *P. scandens* f. *mairei*, *P. scandens* f. *megaphylla*, *P. scandens* f. *microphylla*, *P. scandens* f. *rubescens*, *P. scandens* f. *rubrae-stellaris*, *P. scandens* var. *longituba*, *P. scandens* var. *mairei*, *P. scandens* var. *maritima*, *P. scandens* var. *tomentosa*, *P. scandens* var. *velutina*, *P. scandens* var. *villosa*, *P. sessiliflora*, *P. stenophylla*, *P. tomentosa*, *P. tomentosa* var. *glabra*, *P. tomentosa* var. *mairei*, *P. uraiensis*, *P. villosa*, *Psychotria volubilis*, *Reussia sarmentosa*

oblasti: Anhui, Arunáčalpradéš, Ásám, Bangladéš, Bengálsko, Bhútán, Filipíny, Florida, Fujian, Gansu, Georgia, Guangdong, Guangxi, Hainan, Havajské ostrovy, Hubei, Hunan, Indonésie, Japonsko, J Korea, Jiangsu, Jiangxi, Jižní Karolína, Kambodža, Laos, Louisiana, Malajsie, Manípur, Méghálaja, Melanésie, Mizóram, Myanmar (Barma), Nepál, S Japonsko, Severní Karolína, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Sikkim, Střední Indie, Střední Japonsko, Tchaj-wan, Texas, Thajsko, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan, Zhejiang

Pochází z Asie. Roste v podobě popínavého keře. Dorůstá délky do 5m. Listy jsou vstřícné, vejčitékopinaté, špičaté, tmavězelené, celokrajné, dlouhé 5 - 12cm a báze je kulatá až mírně srdčitá. Květenstvím je terminální lata délky 20 - 40cm, vlastní květy jsou trubkovité, bílé, dlouhé 1,5cm a jícen je růžovofialový. Plody jsou žluté, oranžové až hnědočervené, kulaté a v průměru mají kolem 5mm. Využívá se v tradiční přírodní medicíně.

Paederia grandieri

Paederia lanata

Paederia lanuginosa

synonyma: Hondbesseion lanuginosum, P. macrocarpa

Paederia linearis

synonyma: Hondbesseion lineare, P. consimilis

Paederia majungensis

Paederia mandrarensis

Paederia microcephala

Paederia ntiti

Paederia pallida

Paederia pertomentosa

Paederia pilifera

synonyma: Hondbesseion piliferum, Hondbesseion wallichii, P. kerrii, P. pilifera var. siamensis, P. wallichii

Paederia pospischilii

synonyma: P. petrophila

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě popínavé rostliny. Dorůstá délky 0,3 - 9m. Listy jsou vejčité až eliptické, zakulacené až špičaté, ochlupené, dlouhé 1 - 6,5cm, široké 2 - 2,7cm a báze kulatá až klínovitá. Květenství je svazčité, úžlabní, vlastní květy ochlupené, bílé, červené nebo růžovofialové, trubka dlouhá 0,6 - 1,5cm a laloky jsou dlouhé 0,3 - 1,1cm. Plody jsou světlehnědé, eliptické, dlouhé 1 - 1,1cm a široké 7 - 9mm.

Paederia praetermissa

Paederia sambiranensis

Paederia spectatissima

Paederia stenobotrya

Paederia taolagnarensis

Paederia thorelii

synonyma: P. hirsuta, P. thorelii var. hirsuta

Paederia thouarsiana

Paederia verticillata

synonyma: Hondbesseion verticillatum, P. verticillata var. tomentella

Paederia yunnanensis

synonyma: Cynanchum yunnanense, P. bodinieri, P. rehderiana, P. tomentosa var. purpureocaerulea

oblasti: Yunnan

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=912>

<https://www.rostliny.net/>