

Abies forrestii (Jedle Forrestova)

synonyma: *Abies chengii*, *Abies delavayi* var. *forrestii*, *A.* var. *chengii*, *Abies georgei*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Jedná se spíš o poddruh *A. delavayi*. Pochází z Číny. Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20 (i 40)m. Borka je tmavěšedá. Větve jsou červenohnědé nebo hnědé, drobně ochlupené, později tmavší nebo šedé, zimní pupeny kulovité nebo obvejčité, pryskyřičnaté. Jehlice na horní straně větví vystoupavé, na spodní straně hřebenité, horní strana zelená, délka 1,5 - 4 (i 5)cm, šířky 2 - 2,5mm, na spodu 2 bílé stomatální pruhy a 2 okrajové pryskyřičné kanálky, konec vykrojený (i špičatý nebo tupý). Samičí šištice přisedlé, tmavě hnědorůžovofialové nebo černohnědé, válcovité, dlouhé 7 - 12cm, široké 3,5 - 6cm, semenné šupiny ve středu šištic vějířovitě lichoběžníkovité, dlouhé 1,3 - 2cm, široké 1,3 - 2,3cm, listeny klínovitě obvejčité, okraj může být široce zaoblený, konec rovný nebo se zakřiveným hrotem délky 4 - 7mm. Semena jsou velká 1cm a mají bleděhnědé nebo červenohnědé široce klínovité křídlo. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *georgei*
- 'Smithii'

<https://www.rostliny.net/>