

In Herb. Inst. Bot. nom. V. L. Komarovii Ac. Sc. URSS in Lenin-grad conservatur.

Species singularis: habitu et pubescentia exakte *Lindelofiae stylosae* (Kar. et Kir.) Brand, antherae et corollae dentes *Eurinderac. Fornices Mattiae*. Ut videtur species hybrida (hybridogena) vetus: *Lindelofia* × *Rindera* (*cyclodonta*).

### Секция 3. *Echinorindera* m.

*Eurindera* Kusn., l. c., ex parte!

Сводки отсутствуют или реже они заменены поперечными складочками у зева. Трубка венчика цилиндрическая, без выступов наружу, лопасти удлиненные, ланцетные. Плоды (орешки) на диске с рассеянными шипиками или с килем из более крупных, в один ряд расположенных шипов. Край крыла чаще мелко-зубчиковый, с шипиками по зубчикам. Опушение то стирающееся бедное, как у настоящих Риндер, то более густое стирающееся (*R. echinata*) или серое сохраняющееся (*R. oblongifolia*).

В горах Средней Азии (3 первых вида очень близки друг другу).

*Fornices veri nulli interdum plicis transversalibus in fauce substituti. Corollae tubus cylindricus, lacinias corollinis elongatis lanceolatis. Nuculae disco spinulis sparsis consperso vel medio carinato carina ex spinis majoribus uniserialibus constituta. Alae margines saepius minute denticulati denticulis apice spinuloso-glochidiatis. Pubescentia parca vel serius nulla ut in sectione Eurindera Kusn.. vel cana persistens (R. oblongifolia).*

In montibus Asiae Mediae.

5. ***Rindera austroechinata*** M. Pop. — Корень тонкий, вертикальный, обычно на верхушке 1—3-главый и здесь покрыт матовыми, почти черными чешуйками — остатками прошлогодних черешков; стебель более или менее толстый, гранистый, голый, с многочисленными ветвями, начинающимися или с низа стебля, или с середины; листья голые, стеблевые сидячие, продолговатые, острые, широкие, самые верхние иногда даже яйцевидные. Соцветие метельчатое, наверху щитковидное, завитки уже в конце цветения удлиненные, рыхлые, выпрямленные. Цветоножки почти голые, хорошо развитые, при плодах сильно удлиненные до 3 см дл., прямые. Чашечка 7—8 мм дл., более или менее густо паутинисто-войлочная, доли ее ланцетно-линейные. Венчик желто-фиолетовый, 12 мм дл.; трубка его равна чашечке; лопасти линейно-ланцетные, островатые, несколько короче трубки; складочки в зеве слабо развитые, но заметные. Пыльники 2.5—3 мм дл. Плоды 14—18 мм в диам. (с крылом); диск орешков густо покрыт более длинными якорными шипиками, бока орешков, особенно снизу, тоже несут обильные якорные шипики; крыло орешков широкое, по наружному краю резко мелко-зубчиковое, с шипиками на зубчиках.

В холмах полупустыни, в предгорьях юго-западной и юго-восточной части западного Тянь-шаня. Ср. Азия, Тянь-шань, Таш-